

Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2012

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2013

Citation recommandée: Astudillo, M., Notari, L. & Maffli, E. (2013). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2012 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD).....	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
T9	Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T10	Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)
T12	Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
T13a	Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
T13b	Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
T14	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2012)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes
T15.1b	Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes

- T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), femmes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), femmes
- T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes & femmes
- T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes & femmes
- T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), hommes
- T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), femmes
- T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), hommes & femmes
- T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), hommes
- T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), femmes
- T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), hommes & femmes
- T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2012)
- T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), hommes & femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), hommes & femmes
- T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

- T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), hommes
- T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), femmes
- T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), hommes & femmes
- T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), hommes
- T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), femmes
- T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), hommes & femmes
- T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2012)
- T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2012)
- T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2012)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2012)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

- T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2012)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2012)
- A2 Problème principal à l'admission (2012)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring *act-info* ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse Info à Lausanne.

La statistique *act-info* SAMBAD offre un aperçu de la clientèle et des activités de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques socio-démographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des caractéristiques socio-démographiques des client-e-s à ce moment, des mesures prises par les intervenant-e-s durant la prise en charge et des circonstances de la fin de celle-ci.

En 2012, 77 des 196 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring *act-info*. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête *act-info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'**alcool**, un **opiacé** (héroïne notamment), la **cocaïne** (et dérivés) ou le **cannabis** comme problème principal au moment de leur admission. Les **proches** venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides **N** représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring *act-info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). Dix institutions ont répondu à cette demande. Les données de ces 10 institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes			68.9			77.2			82.0			79.8			21.5			63.5	4'479
femmes			31.1			22.8			18.0			20.2			77.1			36.3	2'562
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			1.3			0.2	14
N**	2'554	1'152	3'706	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	817	1'059	4'479	2'562	7'055	7'055
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.9	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	2.2	0.4	6.4	3.9	5.9	3.9	1.3	1.9	2.1	1.4	1.8	130
15-19	2.2	1.2	1.9	1.4	7.1	2.7	4.8	2.2	4.3	55.2	58.5	55.9	5.7	2.7	3.4	13.6	8.3	11.6	818
20-24	4.1	3.6	4.0	6.9	14.1	8.6	17.2	23.9	18.4	15.9	14.6	15.7	4.4	5.4	5.2	7.7	6.5	7.3	511
25-29	7.8	6.4	7.4	16.7	17.6	16.9	23.4	30.4	24.7	8.4	8.3	8.4	3.5	6.0	5.5	9.7	7.8	9.0	632
30-34	11.1	8.9	10.4	19.8	14.1	18.5	25.4	13.0	23.1	6.0	4.9	5.8	7.9	8.8	8.6	11.2	8.6	10.3	722
35-39	10.2	9.2	9.9	15.3	11.8	14.5	11.0	2.2	9.4	3.5	4.4	3.6	7.0	10.7	9.9	8.9	9.0	8.9	628
40-44	14.1	13.5	13.9	21.5	18.8	20.9	10.5	15.2	11.4	1.9	2.9	2.1	5.7	14.1	12.3	11.6	12.7	12.0	842
45-49	15.4	18.4	16.3	10.1	14.1	11.0	6.7	6.5	6.7	1.4	1.5	1.4	15.8	17.4	17.1	11.2	15.4	12.7	894
50-54	13.0	12.7	12.9	5.2	2.4	4.6	0.5	0.0	0.4	1.2	1.0	1.2	18.4	13.4	14.5	9.4	10.8	9.9	698
55-59	10.2	11.0	10.5	1.7	0.0	1.3	0.5	4.3	1.2	0.1	0.0	0.1	8.8	7.6	7.9	6.8	8.1	7.2	508
60-64	5.6	7.1	6.1	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	4.3	5.1	3.8	5.0	4.3	301
65-69	3.7	4.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.8	4.0	2.5	3.6	2.9	204
70-74	1.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.9	3.1	1.0	1.8	1.3	89
75 et plus	0.8	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.5	1.7	0.6	0.9	0.7	51
N**	2'548	1'147	3'695	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	815	1'043	4'473	2'555	7'028	7'028
données manquantes	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	27
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.6	46.2	45.1	36.9	34.3	36.3	31.7	31.8	31.7	21.6	21.6	21.6	45.9	44.6	44.9	38.3	42.0	39.7	
écart-type	12.9	12.9	12.9	9.2	9.6	9.4	8.2	9.8	8.5	8.1	8.2	8.1	16.2	13.8	14.4	15.1	14.9	15.1	
1er quartile	34.8	37.7	35.6	29.9	26.1	29.2	25.8	24.9	25.5	16.5	16.4	16.4	34.8	35.6	35.5	26.0	30.6	27.4	
valeur médiane	45.0	46.7	45.6	37.0	33.6	36.6	30.6	28.7	30.4	17.9	17.8	17.9	47.8	45.3	46.1	38.2	43.4	40.4	
3e quartile	53.6	55.1	54.1	42.9	42.6	42.8	36.87	40.6	37.1	24.4	23.6	24.3	57.1	52.8	53.9	49.4	52.2	50.6	
N**	2'548	1'147	3'695	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	815	1'043	4'473	2'555	7'028	
données manquantes	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Etat civil*																			
célibataire	41.0	33.2	38.5	74.5	72.4	74.1	74.5	79.5	75.4	94.2	92.2	93.8	31.1	25.1	27.5	56.0	40.2	50.3	3'315
marié-e	31.1	30.2	30.8	14.4	7.9	13.0	14.3	11.4	13.8	3.8	3.1	3.7	50.0	52.8	51.4	24.4	32.9	27.5	1'809
séparé-e	6.1	5.3	5.9	1.5	1.3	1.4	4.1	0.0	3.3	0.8	1.0	0.8	3.4	3.6	3.5	4.3	3.9	4.1	272
divorcé-e	19.7	26.1	21.7	8.5	11.8	9.2	7.1	9.1	7.5	0.7	2.6	1.1	12.1	16.3	15.2	13.6	19.2	15.6	1'029
veuf/veuve	1.7	4.3	2.5	0.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.3	2.4	1.5	1.7	1.2	3.0	1.9	122
partenariat enregistré	0.4	0.9	0.6	0.4	3.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	38
N**	2'392	1'095	3'487	271	76	347	196	44	240	759	193	952	206	748	968	4'170	2'401	6'585	6'585
données manquantes	162	57	219	17	9	26	13	2	15	51	12	63	22	69	91	309	161	470	470
Nationalité*																			
CH	79.1	85.1	81.0	68.6	82.5	72.0	73.2	88.9	76.3	82.9	87.8	83.9	88.3	89.0	88.9	79.5	86.9	82.3	5'307
EU	14.2	11.3	13.3	19.8	13.8	18.3	16.8	11.1	15.6	8.9	7.2	8.5	8.7	8.1	8.2	13.3	9.6	11.9	769
autre	6.6	3.6	5.7	11.6	3.8	9.6	10.1	0.0	8.0	8.2	5.0	7.5	2.9	2.9	3.0	7.2	3.5	5.8	376
N**	2'367	1'078	3'445	242	80	322	179	45	224	733	181	914	206	727	942	4'087	2'356	6'452	6'452
données manquantes	187	74	261	46	5	51	30	1	31	77	24	101	22	90	117	392	206	603	603

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	8.0	7.8	7.9	1.4	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.9	10.0	9.5	9.5	5.3	6.6	5.8	389
périphérie des grands centres	12.6	14.5	13.2	6.5	7.1	6.6	8.8	11.9	9.3	6.9	8.9	7.3	13.7	14.3	14.0	10.5	12.6	11.2	757
villes de moyenne importance	15.6	15.5	15.6	10.8	15.3	11.8	19.5	23.8	20.2	23.4	19.8	22.6	16.1	16.3	16.1	17.1	17.5	17.2	1'159
petites villes	34.0	30.8	33.0	52.3	45.9	50.8	48.8	33.3	46.2	34.3	34.2	34.3	34.6	30.3	31.7	36.7	32.4	35.2	2'373
campagne	29.8	31.5	30.3	29.0	30.6	29.4	22.9	31.0	24.3	34.4	36.6	34.9	25.6	29.6	28.7	30.4	30.8	30.5	2'057
N**	2'435	1'092	3'527	279	85	364	205	42	247	779	202	981	211	756	981	4'292	2'429	6'735	6'735
données manquantes	119	60	179	9	0	9	4	4	8	31	3	34	17	61	78	187	133	320	320
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	40.3	34.2	38.4	37.2	32.3	36.0	36.8	29.4	35.4	13.3	10.4	12.7	12.4	9.2	9.7	31.7	24.0	28.9	1'527
avec un ou les parents	6.1	2.1	4.9	17.4	7.7	15.2	16.1	20.6	16.9	63.6	54.9	61.8	15.2	5.6	8.8	21.6	10.7	17.8	942
avec enfant(s), sans partenaire	1.8	11.2	4.7	2.8	7.7	3.9	0.6	11.8	2.6	0.5	6.0	1.7	5.5	13.2	11.4	1.7	10.6	4.9	257
avec partenaire, sans enfant	23.4	26.6	24.4	13.3	38.5	19.1	16.1	23.5	17.5	4.7	7.7	5.3	22.1	27.6	26.1	18.0	24.8	20.4	1'077
avec partenaire et enfant(s)	18.7	16.1	17.9	10.6	4.6	9.2	15.5	2.9	13.2	2.9	3.8	3.1	38.6	41.7	40.5	15.5	21.2	17.5	924
avec d'autres proches	1.2	1.3	1.2	2.8	1.5	2.5	2.6	2.9	2.6	2.4	2.2	2.4	2.1	0.7	1.0	1.8	1.4	1.7	89
avec des amis (colocation)	2.5	2.6	2.6	3.7	1.5	3.2	6.5	2.9	5.8	3.9	1.6	3.4	2.8	1.6	1.8	3.2	2.3	2.9	151
autre	5.9	5.8	5.9	12.4	6.2	11.0	5.8	5.9	5.8	8.6	13.2	9.6	1.4	0.4	0.6	6.6	4.9	6.0	315
N**	1'903	839	2'742	218	65	283	155	34	189	660	182	842	145	554	708	3'383	1'890	5'282	5'282
données manquantes	651	313	964	70	20	90	54	12	66	150	23	173	83	263	351	1'096	672	1'773	1'773
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
domicile fixe	93.1	94.3	93.5	86.5	77.3	84.2	88.7	87.5	88.5	91.8	93.4	92.2	95.9	97.1	96.9	92.5	94.4	93.2	4'732
sans domicile fixe	4.4	3.7	4.2	9.8	21.2	12.7	8.3	12.5	9.1	5.2	3.6	4.9	3.4	2.9	3.0	5.0	4.2	4.7	240
institution	2.5	2.0	2.3	3.6	1.5	3.1	3.0	0.0	2.4	2.9	3.0	2.9	0.7	0.0	0.1	2.4	1.4	2.0	104
N**	1'864	814	2'678	193	66	259	133	32	165	613	167	780	148	546	703	3'235	1'832	5'076	5'076
données manquantes	690	338	1028	95	19	114	76	14	90	197	38	235	80	271	356	1244	730	1979	1'979

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

Type de relation de couple*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
sans partenaire, seul-e	35.3	34.9	35.2	44.7	15.5	36.7	34.1	35.3	34.4	68.3	48.2	64.5	18.2	11.5	12.8	41.5	29.0	36.7	1'617
relations temporaires	3.8	3.3	3.6	4.6	12.1	6.7	11.4	17.6	12.7	5.6	13.6	7.1	5.8	2.2	2.9	4.5	4.5	4.5	198
parten. fixe, vivant séparé	11.8	13.9	12.5	19.7	22.4	20.5	20.3	26.5	21.7	15.3	18.2	15.9	5.8	10.3	9.6	12.9	13.9	13.3	587
parten. fixe, mén. commun	49.1	47.9	48.7	30.9	50.0	36.2	34.1	20.6	31.2	10.8	20.0	12.5	70.2	76.0	74.8	41.1	52.6	45.5	2'005
N**	1'642	791	2'433	152	58	210	123	34	157	464	110	574	121	504	626	2'721	1'685	4'407	4'407
données manquantes	912	361	1'273	136	27	163	86	12	98	346	95	441	107	313	433	1'758	877	2'648	2'648
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	41.3	35.3	39.4	64.5	50.8	61.2	59.0	68.8	60.8	91.2	84.2	89.6	31.3	20.5	23.7	53.6	38.5	48.0	2'444
1 enfant	18.8	22.1	19.9	20.7	36.9	24.6	21.6	12.5	19.9	5.3	9.9	6.3	17.3	20.2	19.4	16.1	20.0	17.5	893
2 enfants	27.3	29.9	28.1	13.3	3.1	10.8	15.1	9.4	14.0	2.9	3.9	3.2	33.3	40.2	38.4	21.0	28.4	23.8	1'210
3 enfants ou plus	12.6	12.7	12.6	1.5	9.2	3.4	4.3	9.4	5.3	0.6	2.0	0.9	18.0	19.0	18.6	9.3	13.1	10.7	545
N**	1'881	873	2'754	203	65	268	139	32	171	543	152	695	150	584	743	3'180	1'903	5'092	5'092
données manquantes	673	279	952	85	20	105	70	14	84	267	53	320	78	233	316	1'299	659	1'963	1'963
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	73.2	63.8	70.1	76.6	71.4	75.2	79.8	78.1	79.4	65.8	52.4	62.8	47.7	35.4	38.4	70.7	56.0	65.1	2'891
1 enfant	11.7	19.1	14.1	14.6	21.4	16.4	7.3	12.5	8.5	8.6	19.6	11.0	21.2	26.6	25.4	11.4	20.3	14.8	659
2 enfants	10.5	13.2	11.4	7.6	3.6	6.5	8.3	6.3	7.8	20.0	20.3	20.1	20.5	28.3	26.3	12.6	17.6	14.5	642
3 enfants ou plus	4.7	3.9	4.4	1.3	3.6	1.9	4.6	3.1	4.3	5.6	7.7	6.1	10.6	9.6	9.9	5.2	6.2	5.6	249
N**	1'596	773	2'369	158	56	214	109	32	141	500	143	643	132	508	649	2'735	1'697	4'441	4'441
données manquantes	958	379	1'337	130	29	159	100	14	114	310	62	372	96	309	410	1'744	865	2'614	2'614

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	2.8	5.6	3.6	4.5	3.2	4.2	1.4	5.0	2.2	21.7	19.7	21.3	7.4	4.3	5.3	8.0	6.8	7.6	366
scolarité obligatoire	13.0	15.0	13.6	35.8	37.1	36.1	22.9	30.0	24.5	50.5	56.6	51.8	12.5	13.6	14.4	23.9	21.0	23.0	1'108
scolarité complémentaire	3.4	5.6	4.1	2.5	12.9	4.9	2.1	7.5	3.3	4.1	5.8	4.5	2.2	3.1	2.8	3.4	5.3	4.1	196
apprentissage/école prof.	60.4	52.2	57.9	50.7	41.9	48.7	59.7	52.5	58.2	20.5	16.8	19.7	46.3	46.5	45.7	49.0	45.3	47.6	2'296
maturité/diplôme	3.6	4.6	3.9	2.0	1.6	1.9	4.2	2.5	3.8	0.6	0.0	0.5	2.9	4.8	4.3	3.0	5.0	3.7	178
école normale, pédagog.	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	3.7	5.0	4.6	0.6	2.2	1.2	56
form. profession. supérieure	7.7	6.3	7.3	1.0	1.6	1.1	5.6	2.5	4.9	0.8	0.0	0.6	10.3	8.6	8.9	5.5	6.0	5.7	273
école profession. supérieure	1.6	1.3	1.5	0.5	1.6	0.8	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	1.5	3.3	2.8	1.1	1.5	1.3	61
haute école spécialisée	2.1	1.7	2.0	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.5	0.6	0.6	0.6	4.4	3.6	3.7	1.7	2.0	1.8	87
université, haute école	4.8	6.0	5.2	1.5	0.0	1.1	2.1	0.0	1.6	0.6	0.6	0.6	8.8	7.2	7.4	3.8	4.8	4.1	199
N**	1'741	767	2'508	201	62	263	144	40	184	653	173	826	136	419	564	3'156	1'655	4'820	4'820
données manquantes	813	385	1'198	87	23	110	65	6	71	157	32	189	92	398	495	1'323	907	2'235	2'235
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	30.4	37.9	32.7	49.1	55.6	50.4	25.6	47.6	30.3	22.9	28.3	23.8	15.8	27.9	25.2	29.0	34.6	30.8	687
apprenti-e, stagiaire	2.8	0.5	2.1	8.3	3.7	7.4	7.7	4.8	7.1	24.9	34.0	26.5	1.8	3.0	2.8	8.0	4.5	6.8	152
manœuvre, aide	2.8	5.1	3.5	4.6	7.4	5.2	2.6	4.8	3.0	4.1	0.0	3.4	0.0	3.0	2.4	2.9	4.1	3.3	73
ouvrier/ère formé-e sur le tas	6.2	4.6	5.7	13.0	11.1	12.6	11.5	0.0	9.1	3.7	1.9	3.4	0.0	4.6	3.5	6.1	4.6	5.6	125
ouvrier/ère formé-e (CFC)	16.2	10.7	14.5	14.8	14.8	14.8	28.2	9.5	24.2	11.0	7.5	10.4	14.0	5.1	7.1	15.7	10.0	13.8	308
contremaître-sse	2.9	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.4	2.0	0.3	1.4	32
employé-e non qualifié-e	14.0	19.6	15.7	5.6	3.7	5.2	11.5	19.0	13.1	7.3	1.9	6.4	12.3	28.9	25.2	11.9	19.6	14.5	322
empl. qualifié-e, cadre moyen	9.0	8.7	8.9	2.8	3.7	3.0	6.4	4.8	6.1	2.9	1.9	2.7	22.8	10.2	13.0	7.7	8.0	7.8	174
employé-e, cadre supérieur	4.7	2.5	4.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.0	3.9	3.6	1.9	3.1	68
indépendant-e	9.6	6.9	8.8	1.9	0.0	1.5	3.8	0.0	3.0	0.8	1.9	1.0	14.0	9.1	10.2	7.3	6.2	6.9	154
écolier/ère, étudiant-e	0.8	1.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	21.6	22.6	21.8	7.0	6.1	6.3	5.1	5.5	5.3	117
autre statut	0.8	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.7	15
N**	902	393	1'295	108	27	135	78	21	99	245	53	298	57	197	254	1'487	740	2'227	2'227
données manquantes	1'652	759	2'411	180	58	238	131	25	156	565	152	717	171	620	805	2'992	1'822	4'828	4'828

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaires	56.6	43.6	52.6	36.5	25.0	33.8	58.8	38.1	55.1	28.7	24.7	27.9	66.5	59.6	60.5	49.8	45.3	48.2	2'939
économies, épargne	2.1	0.8	1.7	0.8	0.0	0.6	3.6	0.0	3.0	0.7	0.0	0.5	1.1	0.6	0.7	1.7	0.6	1.3	79
rente (AVS, AI ou autre)	13.9	18.5	15.3	17.3	15.8	16.9	5.7	11.9	6.8	5.1	6.2	5.3	16.8	11.1	12.2	11.6	15.0	12.8	781
aide sociale	14.9	13.0	14.3	32.5	50.0	36.6	13.9	26.2	16.1	10.0	11.3	10.3	2.7	1.7	1.9	14.1	10.8	12.9	789
assurance-chômage	7.3	6.2	7.0	6.8	3.9	6.2	7.2	7.1	7.2	2.3	2.6	2.4	1.1	2.1	1.9	6.1	4.3	5.4	332
soutien du/de la partenaire	0.9	13.3	4.7	0.8	1.3	0.9	1.5	4.8	2.1	0.4	2.6	0.9	0.5	19.7	15.2	0.8	12.9	5.1	311
soutien parents/proches/amis	2.8	2.6	2.7	3.2	3.9	3.4	6.7	11.9	7.6	51.6	51.5	51.6	10.3	4.8	6.9	14.3	9.7	12.8	781
deal, combinés	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	8
autres revenus illégaux	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
prostitution	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3
autre	1.3	1.5	1.4	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	70
N**	2'226	984	3'210	249	76	325	194	42	236	732	194	926	185	631	825	3'924	2'168	6'101	6'101
<i>données manquantes</i>	328	168	496	39	9	48	15	4	19	78	11	89	43	186	234	555	394	954	954
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	50.1	29.2	43.8	32.7	17.1	29.0	53.6	25.6	48.5	23.6	13.8	21.6	61.6	34.7	40.2	43.5	28.5	38.2	2'231
activité à temps partiel	5.2	19.7	9.6	2.4	10.5	4.4	1.0	7.0	2.1	1.9	7.2	3.0	3.8	30.6	24.3	4.1	19.9	9.6	560
plusieurs activités occas.	0.9	1.1	0.9	0.8	2.6	1.2	0.5	4.7	1.3	0.7	2.1	1.0	0.0	1.3	1.0	0.7	1.3	0.9	54
en formation	3.1	3.3	3.2	1.6	0.0	1.2	6.3	4.7	6.0	51.4	54.9	52.1	11.3	5.6	7.8	14.7	11.1	13.5	790
sans activité prof.	17.8	28.9	21.2	32.7	32.9	32.7	10.4	20.9	12.3	6.2	9.7	7.0	17.6	22.2	20.9	15.3	24.7	18.6	1'083
sans trav., en quête d'emploi	14.3	11.6	13.5	22.4	17.1	21.2	17.2	16.3	17.0	9.2	6.7	8.7	1.9	4.2	3.7	13.2	8.9	11.7	683
sans trav., futur empl. garanti	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.4	25
autre	8.0	6.2	7.5	6.9	19.7	10.0	9.9	20.9	11.9	6.2	5.6	6.1	3.8	1.3	1.9	7.9	5.5	7.0	411
N**	2'131	931	3'062	245	76	321	192	43	235	737	195	932	159	553	721	3'795	2'033	5'837	5'837
<i>données manquantes</i>	423	221	644	43	9	52	17	3	20	73	10	83	69	264	338	684	529	1'218	1'218

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	24.8	32.0	26.7	21.1	12.5	19.8	14.9	50.0	22.0	41.3	44.2	41.9	24.0	14.3	16.3	26.9	30.6	28.0	388
moins de 1000 fr.	6.5	6.8	6.6	17.8	31.3	19.8	10.6	8.3	10.2	25.1	27.9	25.7	20.0	11.2	13.0	11.9	11.4	11.7	163
de 1001 à 2000 fr.	5.5	10.2	6.7	18.9	12.5	17.9	10.6	0.0	8.5	7.2	16.3	9.0	0.0	15.3	12.2	6.9	11.7	8.3	115
de 2001 à 3000 fr.	9.9	15.5	11.4	11.1	25.0	13.2	8.5	25.0	11.9	8.4	9.3	8.6	4.0	11.2	9.8	9.2	14.2	10.7	148
de 3001 à 4000 fr.	12.8	14.1	13.1	12.2	12.5	12.3	6.4	16.7	8.5	1.2	0.0	1.0	12.0	15.3	14.6	11.1	12.7	11.5	160
de 4001 à 5000 fr.	18.5	7.8	15.7	12.2	6.3	11.3	21.3	0.0	16.9	10.2	2.3	8.6	16.0	9.2	10.6	16.1	6.7	13.4	186
de 5001 à 6000 fr.	10.4	9.2	10.1	4.4	0.0	3.8	12.8	0.0	10.2	3.0	0.0	2.4	12.0	9.2	9.8	8.3	7.0	7.9	110
de 6001 à 8000 fr.	7.5	3.4	6.4	2.2	0.0	1.9	10.6	0.0	8.5	3.0	0.0	2.4	4.0	10.2	8.9	6.3	4.2	5.7	79
de 8001 à 10 000 fr.	2.9	0.5	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	3.1	2.4	2.2	1.0	1.9	26
de 10 001 à 15 000 fr.	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	2.4	1.0	0.5	0.9	12
plus de 15 000 fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1
N**	585	206	791	90	16	106	47	12	59	167	43	210	25	98	123	986	402	1'388	1'388
données manquantes	1'969	946	2'915	198	69	267	162	34	196	643	162	805	203	719	936	3'493	2'160	5'667	5'667
Dettes*																			
aucune dette	71.6	85.6	75.6	38.8	54.2	41.7	40.9	60.0	43.5	84.3	87.8	84.9	88.0	88.1	88.3	70.7	83.8	74.8	1'842
jusqu'à 5000 fr.	3.9	4.7	4.1	7.8	8.3	7.9	18.3	6.7	16.7	5.0	5.1	5.0	2.0	2.2	2.1	5.5	4.2	5.1	125
de 5001 à 10 000 fr.	5.7	2.5	4.7	14.6	12.5	14.2	12.9	0.0	11.1	5.0	4.1	4.8	0.0	3.2	2.5	6.5	3.4	5.5	136
de 10 001 à 25 000 fr.	6.8	2.5	5.6	13.6	16.7	14.2	15.1	13.3	14.8	3.8	1.0	3.3	2.0	2.7	2.5	7.1	3.4	5.9	146
de 25 001 à 50 000 fr.	5.5	2.8	4.7	10.7	0.0	8.7	3.2	13.3	4.6	0.7	1.0	0.8	2.0	2.7	2.5	4.4	2.9	3.9	97
de 50 001 à 100 000 fr.	2.6	1.1	2.2	7.8	8.3	7.9	5.4	6.7	5.6	0.5	0.0	0.4	4.0	0.0	0.8	2.8	1.2	2.3	56
plus de 100 000 fr.	4.0	0.8	3.1	6.8	0.0	5.5	4.3	0.0	3.7	0.7	1.0	0.8	2.0	1.1	1.3	3.1	1.1	2.5	61
N**	883	360	1'243	103	24	127	93	15	108	420	98	518	50	185	240	1'701	757	2'463	2'463
données manquantes	1'671	792	2'463	185	61	246	116	31	147	390	107	497	178	632	819	2'778	1'805	4'592	4'592

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	89.8	98.7	92.4	58.3	69.6	60.5	75.0	76.9	75.4	85.4	97.5	87.4	86.2	96.4	88.8	1'446
emprisonnement	5.2	1.0	4.0	20.8	8.7	18.5	8.3	7.7	8.2	6.5	2.5	5.9	6.6	1.7	5.3	87
détention préventive	3.0	0.3	2.2	11.5	17.4	12.6	12.5	15.4	13.1	6.5	0.0	5.4	4.7	1.7	3.9	64
emprisonnement et détention préventive	2.1	0.0	1.5	9.4	4.3	8.4	4.2	0.0	3.3	1.5	0.0	1.3	2.5	0.2	1.9	31
N**	771	315	1'086	96	23	119	48	13	61	199	40	239	1'211	417	1'628	1'628
<i>données manquantes</i>	1'783	837	2'620	192	62	254	161	33	194	611	165	776	3'040	1'328	4'368	4'368
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	31.6	66.7	33.3	21.9	20.0	21.6	14.3	0.0	11.1	44.0	0.0	42.3	32.0	27.3	31.6	43
> 1 à 2 mois	1.8	0.0	1.7	6.3	20.0	8.1	14.3	50.0	22.2	4.0	0.0	3.8	4.8	18.2	5.9	8
> 2 à 6 mois	40.4	0.0	38.3	37.5	40.0	37.8	14.3	50.0	22.2	28.0	0.0	26.9	34.4	27.3	33.8	46
> 6 à 12 mois	10.5	0.0	10.0	9.4	20.0	10.8	28.6	0.0	22.2	12.0	100.0	15.4	11.2	18.2	11.8	16
plus de 1 an	15.8	33.3	16.7	25.0	0.0	21.6	28.6	0.0	22.2	12.0	0.0	11.5	17.6	9.1	16.9	23
N**	57	3	60	32	5	37	7	2	9	25	1	26	125	11	136	136
<i>données manquantes</i>	22	1	23	8	2	10	5	1	6	4	0	4	42	4	46	46

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale et secondaire, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
initiative personnelle	33.5	41.1	35.9	44.5	51.8	46.2	51.5	44.2	50.2	21.2	21.6	21.3	69.8	74.3	72.4	35.8	51.7	41.5	2'692
conjoint-e/partenaire	4.8	2.7	4.1	2.5	0.0	1.9	4.1	0.0	3.3	1.4	0.5	1.3	3.5	2.1	2.3	3.9	2.1	3.2	209
famille	3.2	5.5	3.9	3.9	7.1	4.6	7.7	7.0	7.5	9.9	8.8	9.6	8.9	5.7	6.3	5.6	6.1	5.7	373
ami-e-s, collègues, conaiss.	1.6	3.1	2.0	2.8	4.7	3.3	2.0	7.0	2.9	1.2	2.6	1.5	3.5	4.6	4.3	1.8	3.7	2.4	159
institut. ambulatoire spécialisée	1.5	2.2	1.7	3.6	7.1	4.4	3.1	0.0	2.5	0.4	2.1	0.7	2.5	2.5	2.5	1.5	2.4	1.9	121
institut. résidentielle spécialisée	4.8	5.5	5.0	6.0	2.4	5.2	3.1	9.3	4.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	3.5	3.0	3.4	218
cabinet médical	8.3	9.0	8.5	9.3	3.5	7.9	3.1	11.6	4.6	2.9	4.6	3.2	4.0	2.6	2.9	6.6	6.4	6.5	423
hôpital, clinique	11.1	13.1	11.7	4.6	8.2	5.5	4.6	2.3	4.2	2.6	2.1	2.5	1.5	0.8	1.0	7.6	7.3	7.5	487
service sociaux	6.8	5.8	6.5	7.5	12.9	8.7	1.5	7.0	2.5	3.4	4.1	3.6	1.0	2.8	2.3	5.5	4.8	5.2	340
mes. pénale/administrative	16.9	6.6	13.7	11.0	2.4	9.0	16.3	7.0	14.6	45.1	39.7	44.0	1.5	0.4	1.9	20.1	6.9	15.5	1'007
employeur/se	4.8	1.9	3.9	1.4	0.0	1.1	0.0	4.7	0.8	2.1	1.5	2.0	1.0	0.3	0.4	3.4	1.4	2.7	175
enseignant-e	0.2	1.1	0.4	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	4.1	4.6	4.2	0.0	0.6	0.4	1.3	1.2	1.2	80
autre	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	1.9	2.6	0.0	2.1	4.9	7.7	5.5	3.0	2.9	2.9	3.3	3.0	3.2	207
N**	2'349	1'045	3'394	281	85	366	196	43	239	760	194	954	202	724	938	4'144	2'335	6'491	6'491
données manquantes	205	107	312	7	0	7	13	3	16	50	11	61	26	93	121	335	227	564	564
Instance d'envoi secondaire***																			
initiative personnelle	31.6	21.3	28.8	27.2	11.1	23.8	19.5	50.0	25.5	17.8	11.9	16.6	3.9	10.8	9.3	26.9	17.3	23.8	669
conjoint-e/partenaire	8.8	8.5	8.7	6.6	5.6	6.4	7.3	0.0	5.9	3.0	1.5	2.7	15.8	6.1	8.2	8.4	6.8	7.9	221
famille	3.6	5.6	4.1	5.1	2.8	4.7	3.7	0.0	2.9	6.8	6.0	6.6	5.3	4.3	4.5	4.5	5.1	4.7	132
ami-e-s, collègues, conaiss.	1.8	2.9	2.1	2.9	2.8	2.9	2.4	0.0	2.0	1.1	4.5	1.8	5.3	3.2	3.7	1.9	3.1	2.3	65
institut. ambulatoire spécialisée	1.3	0.9	1.2	1.5	2.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	2.6	1.4	1.7	1.1	1.0	1.1	30
institut. résidentielle spécialisée	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	1.2	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	1.3	0.0	0.3	2.2	1.5	2.0	55
cabinet médical	4.4	5.8	4.8	8.8	16.7	10.5	6.1	5.0	5.9	2.3	1.5	2.1	2.6	1.8	2.0	4.6	5.2	4.8	135
hôpital, clinique	4.3	2.9	3.9	1.5	0.0	1.2	4.9	0.0	3.9	1.1	3.0	1.5	0.0	2.2	1.7	3.4	2.4	3.1	87
service sociaux	1.8	1.6	1.8	2.9	5.6	3.5	6.1	0.0	4.9	0.4	3.0	0.9	1.3	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	51
mes. pénale/administrative	4.4	2.5	3.9	2.2	5.6	2.9	8.5	0.0	6.9	5.3	3.0	4.8	1.3	0.0	0.3	4.2	1.8	3.4	95
employeur/se	2.2	1.6	2.0	0.7	2.8	1.2	1.2	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.6	1.1	1.5	41
enseignant-e	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	10
autre	1.3	0.9	1.2	0.0	2.8	0.6	1.2	0.0	1.0	1.9	1.5	1.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	39
aucune	41.0	47.2	42.7	46.3	50.0	47.1	43.9	45.0	44.1	59.8	67.2	61.3	60.5	68.6	66.9	45.1	55.2	48.4	1359.0
N**	1'195	445	1'640	136	36	172	82	20	102	264	67	331	76	277	353	1'902	908	2'810	2'810
données manquantes	1'359	707	2'066	152	49	201	127	26	153	546	138	684	152	540	706	2'577	1'654	4'245	4'245

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T10 Type d'aide attendue à l'admission et statut légal de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2012)

Type d'aide attendue*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
problèmes addictifs	84.0	90.5	85.8	90.7	95.1	91.6	88.8	82.6	87.6	75.3	77.9	75.8	70.7	65.4	66.7	81.6	82.4	81.8	2'538
problèmes somatiques	3.0	3.0	3.0	4.3	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	2.3	1.2	0.7	0.8	2.4	2.3	2.4	74
problèmes psychiques	14.9	25.0	17.8	15.5	17.1	15.8	8.2	30.4	12.4	10.3	15.6	11.3	11.0	19.1	17.2	13.5	21.9	16.2	502
problèmes relationnels	14.2	16.0	14.7	5.0	9.8	5.9	9.2	21.7	11.6	6.6	15.6	8.3	28.0	41.9	38.7	12.3	22.7	15.6	485
problèmes familiaux	9.0	10.7	9.5	5.6	7.3	5.9	11.2	17.4	12.4	9.4	19.5	11.3	32.9	38.6	37.3	9.9	18.7	12.7	394
problèmes financiers	6.2	3.6	5.5	18.0	9.8	16.3	11.2	21.7	13.2	5.0	5.2	5.0	4.9	7.7	7.1	7.4	5.9	6.9	215
problèmes professionnels, de formatio	11.5	10.3	11.1	14.3	17.1	14.9	14.3	17.4	14.9	11.3	15.6	12.1	6.1	5.1	5.4	11.7	9.7	11.1	343
problèmes de logement	3.7	3.4	3.6	8.7	2.4	7.4	6.1	4.3	5.8	3.8	2.6	3.5	6.1	6.3	6.2	4.2	3.9	4.1	128
problèmes de violence	1.3	1.0	1.2	0.6	2.4	1.0	1.0	4.3	1.7	1.3	0.0	1.0	1.2	4.0	3.4	1.1	1.8	1.3	41
problèmes juridiques	7.5	3.8	6.5	6.2	2.4	5.4	15.3	8.7	14.0	11.3	6.5	10.3	2.4	5.1	4.5	7.9	4.2	6.7	208
autre(s)	2.3	1.4	2.0	1.2	0.0	1.0	5.1	0.0	4.1	2.8	2.6	2.8	0.0	2.6	2.0	3.0	1.8	2.6	81
aucune attente	9.7	4.8	8.3	1.9	2.4	2.0	3.1	0.0	2.5	18.4	13.0	17.4	3.7	1.8	2.3	10.3	4.2	8.4	259
N**	1'272	505	1'777	161	41	202	98	23	121	320	77	397	82	272	354	2'106	995	3'101	3'101
données manquantes	1'282	647	1'929	127	44	171	111	23	134	490	128	618	146	545	705	2'373	1'567	3'954	3'954
Statut légal du traitement/de la prise en charge*																			
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art 19a ch. 2 Lstup)	0.7	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	2.3	4.8	2.8	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	63
abandon poursuite pénale si soumis à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art 19a ch. 3 Lstup)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4
mesures concernant les délinquants anormaux (art 43 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
traitement des alcooliques et des toxicomanes (art 44 CPS)	2.2	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1.2	33
irresponsabilité (art 10 CPS)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
responsabilité restreinte (art 11 CPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
exécution de mesures pr toxicomanes dans une maison d'éducation au travail (art 2a ord. 3 rel. au CPS RS 311.03)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.7	18
autre	12.0	6.4	10.5	8.9	8.8	8.9	18.6	4.8	15.9	21.8	10.1	19.4	0.0	0.4	0.3	12.8	5.2	10.4	282
aucune mesure (traitement volontaire)	84.8	92.6	87.0	90.4	91.2	90.5	74.4	90.5	77.6	61.3	66.7	62.4	100.0	99.6	99.7	82.0	92.3	85.3	2'311
N**	1'131	435	1'566	135	34	169	86	21	107	271	69	340	72	237	309	1'849	860	2'709	2'709
données manquantes	1'423	717	2'140	153	51	204	123	25	148	539	136	675	156	580	750	2'630	1'702	4'346	4'346

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prises en charge antérieures*																			
non	45.9	41.9	44.7	20.3	20.3	20.3	46.4	41.0	45.4	77.3	76.1	77.0	67.1	66.9	67.0	52.8	53.5	53.1	3'068
oui	54.1	58.1	55.3	79.7	79.7	79.7	53.6	59.0	54.6	22.7	23.9	23.0	32.9	33.1	33.0	47.2	46.5	46.9	2'712
N**	2'113	930	3'043	227	74	301	179	39	218	687	180	867	173	611	789	3'720	2'055	5'780	5'780
<i>données manquantes</i>	441	222	663	61	11	72	30	7	37	123	25	148	55	206	270	759	507	1'275	1'275
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescript. d'héroïne	1.7	1.3	1.5	7.1	12.0	8.4	0.0	5.6	1.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.9	41
substitution (méthadone, subutex)	4.0	4.8	4.3	67.9	70.0	68.4	16.7	38.9	21.4	5.7	3.1	5.2	5.7	2.8	3.5	11.6	9.6	10.9	236
autre tt médicam. des dépendances	9.2	10.7	9.7	7.9	10.0	8.4	4.5	11.1	6.0	0.8	6.3	1.9	0.0	1.9	1.4	7.9	8.6	8.1	176
prise en charge ambulatoire	71.8	73.7	72.4	58.6	58.0	58.4	75.8	77.8	76.2	77.9	90.6	80.5	77.1	83.3	81.3	72.1	75.3	73.2	1'581
traitement résidentiel	49.5	53.4	50.7	47.1	50.0	47.9	45.5	44.4	45.2	30.3	15.6	27.3	14.3	9.3	10.4	45.7	43.2	44.8	969
sevrage	44.9	49.0	46.2	40.7	54.0	44.2	34.8	33.3	34.5	18.9	15.6	18.2	5.7	10.2	9.0	40.0	38.7	39.5	854
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.3	7.9	6.1	2.9	4.0	3.2	1.5	0.0	1.2	3.3	3.1	3.2	0.0	7.4	5.6	4.4	6.6	5.2	112
autre(s)	2.2	3.3	2.5	0.0	2.0	0.5	4.5	5.6	4.8	4.1	3.1	3.9	11.4	7.4	9.0	2.4	3.9	3.0	64
N**	964	457	1'421	140	50	190	66	18	84	122	32	154	35	108	144	1'419	741	2'161	2'161
<i>données manquantes</i>	179	83	262	41	9	50	30	5	35	34	11	45	22	94	116	336	215	551	551

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution et autre traitement/prise en charge à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution ou prescription d'héroïne*																
non	98.3	97.8	98.2	46.5	40.6	45.0	93.3	82.4	91.1	99.5	100.0	99.6	94.9	94.7	94.9	4'018
oui	1.7	2.2	1.8	53.5	59.4	55.0	6.7	17.6	8.9	0.5	0.0	0.4	5.1	5.3	5.1	217
N**	1'797	769	2'566	187	64	251	135	34	169	610	169	779	3'003	1'232	4'235	4'235
<i>données manquantes</i>	757	383	1'140	101	21	122	74	12	86	200	36	236	1'248	513	1'761	1'761
Type de substitution***																
héroïne	3.4	0.0	2.2	2.0	7.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	3.3	7
méthadone	79.3	50.0	68.9	81.8	81.6	81.8	85.7	66.7	76.9	100.0	0.0	100.0	81.0	73.4	78.7	166
autres opiacés	10.3	31.3	17.8	15.2	10.5	13.9	14.3	16.7	15.4	0.0	0.0	0.0	14.3	15.6	14.7	31
autres substances	6.9	18.8	11.1	1.0	0.0	0.7	0.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	3.3	7
N**	29	16	45	99	38	137	7	6	13	2	0	2	147	64	211	211
<i>données manquantes</i>	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	5	1	6	6
Autre prise en charge parallèle*																
non	91.2	87.8	90.2	85.6	88.9	86.3	90.7	85.7	89.7	95.7	97.2	96.0	91.7	89.7	91.2	2'237
oui	8.8	12.2	9.8	14.4	11.1	13.7	9.3	14.3	10.3	4.3	2.8	4.0	8.3	10.3	8.8	216
N**	1'146	449	1'595	139	36	175	86	21	107	280	72	352	1'811	642	2'453	2'453
<i>données manquantes</i>	1'408	703	2'111	149	49	198	123	25	148	530	133	663	2'440	1'103	3'543	3'543
Type de la prise en charge parallèle****																
prise en charge ambulatoire	44.4	51.0	46.7	75.0	75.0	75.0	42.9	0.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	104
traitement résidentiel	10.1	3.9	8.0	5.0	0.0	4.2	57.1	0.0	40.0	8.3	0.0	7.1	11.6	3.2	9.1	19
groupe d'entraide ou d'auto-support	8.1	13.7	10.0	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.3	7.7	16
autre(s)	42.4	41.2	42.0	20.0	25.0	20.8	14.3	100.0	40.0	41.7	50.0	42.9	37.0	43.5	38.9	81
N**	99	51	150	20	4	24	7	3	10	12	2	14	146	62	208	208
<i>données manquantes</i>	2	4	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8	8

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de substitution. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pris-e-s en charge parallèlement. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T13a Admission suite à une cure de sevrage, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Admission suite à une cure de sevrage*																
non	77.3	75.4	76.8	82.1	88.9	83.4	83.3	84.0	83.5	96.8	98.4	97.1	82.1	79.8	81.4	2'045
sevrage dans la même institution	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	0.5	0.4	0.5	12
sevrage dans une autre institution	22.0	24.0	22.6	17.9	11.1	16.6	15.6	16.0	15.7	2.8	1.6	2.6	17.4	19.8	18.1	454
N**	1'161	495	1'656	151	36	187	90	25	115	283	63	346	1'824	687	2'511	2'511
<i>données manquantes</i>	1'393	657	2'050	137	49	186	119	21	140	527	142	669	2'427	1'058	3'485	3'485

T13b Fréquence des sevrages sans aide professionnelle avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

Fréq. sevrages sans accompagnement*	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
jamais	64.7	56.8	62.4	21.9	33.3	24.4	53.5	0.0	41.8	71.6	65.7	70.6	63.0	54.9	60.9	743
une fois	7.8	10.9	8.7	14.1	5.6	12.2	7.0	41.7	14.5	13.6	20.0	14.7	9.2	12.6	10.1	123
deux ou trois fois	8.2	11.4	9.1	12.5	16.7	13.4	18.6	8.3	16.4	3.6	11.4	4.9	8.0	11.7	8.9	109
plus de trois fois	19.3	21.0	19.8	51.6	44.4	50.0	20.9	50.0	27.3	11.2	2.9	9.8	19.8	20.8	20.1	245
N**	564	229	793	64	18	82	43	12	55	169	35	204	903	317	1'220	1'220
<i>données manquantes</i>	1'990	923	2'913	224	67	291	166	34	200	641	170	811	3'348	1'428	4'776	4'776

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T14 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2012)

Tous patients et patientes									
Problème principal*	Hommes	Femmes	Total	N		Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%			%	%	%	
alcool	60.1	66.0	61.8	3'706	alcool	60.1	66.0	61.8	3'706
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.3	0.1	0.2	13	cocktails	0.3	0.1	0.2	13
héroïne	5.4	4.1	5.0	299	opiacés	6.5	4.8	6.0	360
méthadone	0.8	0.5	0.7	41					
autres opiacés	0.4	0.2	0.3	20					
cocaïne	4.9	2.5	4.2	252	cocaïne et dérivés	4.9	2.6	4.3	255
crack, freebase	0.0	0.1	0.1	3					
amphétamines	0.6	0.5	0.5	32	stimulants	1.1	0.9	1.0	61
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.5	0.3	0.5	28					
autres stimulants	0.0	0.1	0.0	1					
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0	médicaments	0.6	1.8	1.0	59
benzodiazépines	0.6	1.4	0.8	49					
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.5	0.2	10					
LSD	0.2	0.1	0.1	8	hallucinogènes	0.2	0.1	0.1	8
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0					
cannabis	19.1	11.7	16.9	1'015	cannabis	19.1	11.7	16.9	1'015
tabac	1.8	3.4	2.3	137	tabac	1.8	3.4	2.3	137
substances volatiles	0.0	0.1	0.0	1	autres substances	1.0	1.1	1.1	64
autre substance	1.0	1.1	1.1	63					
jeu pathologique	1.8	1.2	1.6	98	troubles assimilables à une addiction	4.4	7.4	5.3	318
troubles alimentaires	0.2	4.9	1.5	92					
autres troubles assimilables à une addiction	2.4	1.4	2.1	128					
N**	4'251	1'745	5'996	5'996		4'251	1'745	5'996	5'996
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	31.9	71.4	30.9	29.8	42.9	23.5	0.0	26.3	4.4	100.0
1 jour par semaine ou moins	7.4	0.0	8.5	27.4	25.0	5.9	100.0	20.6	1.5	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.0	14.3	13.3	21.8	17.9	5.9	0.0	15.8	2.9	0.0
4 à 6 jours par semaine	10.7	14.3	6.1	9.7	10.7	5.9	0.0	7.5	4.4	0.0
une fois par jour	7.0	0.0	17.6	3.2	0.0	11.8	0.0	6.2	2.9	0.0
plusieurs fois par jour	31.1	0.0	23.6	8.1	3.6	47.1	0.0	23.6	83.8	0.0
N**	1'689	7	165	124	28	17	4	601	68	1
<i>données manquantes</i>	865	4	112	85	18	10	3	209	10	43
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.9	33.3	15.3	16.5	13.3	6.7	0.0	7.6	4.2	7.7
1 jour par semaine ou moins	7.2	0.0	10.2	27.6	40.0	13.3	80.0	28.8	1.4	0.0
2 à 3 jours par semaine	16.5	16.7	12.1	28.3	23.3	0.0	0.0	18.5	2.8	0.0
4 à 6 jours par semaine	13.9	16.7	7.6	15.0	13.3	6.7	0.0	9.7	2.8	0.0
une fois par jour	9.3	0.0	21.0	3.1	3.3	0.0	0.0	6.4	2.8	15.4
plusieurs fois par jour	45.2	33.3	33.8	9.4	6.7	73.3	20.0	29.0	85.9	76.9
N**	1'700	6	157	127	30	15	5	579	71	13
<i>données manquantes</i>	854	5	120	82	16	12	2	231	7	31

T15.1b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes

Patientes: problème principal			
Hommes	Jeux pathologiques	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	52.3	16.7	8.6
1 jour par semaine ou moins	11.4	16.7	5.7
2 à 3 jours par semaine	9.1	0.0	5.7
4 à 6 jours par semaine	11.4	33.3	2.9
1 fois par jour	9.1	16.7	12.9
plusieurs fois par jour	6.8	16.7	64.3
N**	44	6	70
<i>données manquantes</i>	33	1	34
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	19.4	0.0	1.5
1 jour par semaine ou moins	22.2	20.0	6.1
2 à 3 jours par semaine	11.1	20.0	9.1
4 à 6 jours par semaine	22.2	20.0	1.5
1 fois par jour	11.1	20.0	15.2
plusieurs fois par jour	13.9	20.0	66.7
N**	36	5	66
<i>données manquantes</i>	41	2	38

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	23.2	0.0	25.4	26.5	33.3	33.3	0.0	19.3	1.9	100.0
1 jour par semaine ou moins	10.0	0.0	10.2	17.6	22.2	5.6	100.0	27.3	1.9	0.0
2 à 3 jours par semaine	13.6	0.0	11.9	26.5	0.0	0.0	0.0	18.0	1.9	0.0
4 à 6 jours par semaine	11.5	0.0	10.2	11.8	11.1	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0
une fois par jour	9.4	0.0	16.9	8.8	11.1	11.1	0.0	5.6	5.6	0.0
plusieurs fois par jour	32.3	0.0	25.4	8.8	22.2	50.0	0.0	18.6	88.9	0.0
N**	733	0	59	34	9	18	1	161	54	1
données manquantes	419	2	24	12	6	14	0	44	5	19
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.1	0.0	16.1	2.9	11.1	0.0	0.0	2.6	1.8	28.6
1 jour par semaine ou moins	7.8	0.0	8.9	20.6	33.3	0.0	100.0	28.8	0.0	14.3
2 à 3 jours par semaine	17.7	0.0	14.3	17.6	11.1	10.5	0.0	21.2	1.8	14.3
4 à 6 jours par semaine	12.8	0.0	7.1	23.5	11.1	0.0	0.0	10.9	1.8	0.0
une fois par jour	11.7	0.0	25.0	14.7	11.1	10.5	0.0	5.8	5.3	0.0
plusieurs fois par jour	42.9	0.0	28.6	20.6	22.2	78.9	0.0	30.8	89.5	42.9
N**	728	0	56	34	9	19	1	156	57	7
données manquantes	424	2	27	12	6	13	0	49	2	13

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), femmes

Patients: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	38.5	3.3	15.4
1 jour par semaine ou moins	30.8	6.6	30.8
2 à 3 jours par semaine	7.7	21.3	15.4
4 à 6 jours par semaine	15.4	6.6	0.0
1 fois par jour	0.0	6.6	15.4
plusieurs fois par jour	7.7	55.7	23.1
N**	13	61	13
données manquantes	8	24	11
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	9.1	0.0	8.3
1 jour par semaine ou moins	45.5	7.3	25.0
2 à 3 jours par semaine	18.2	16.4	25.0
4 à 6 jours par semaine	18.2	12.7	0.0
1 fois par jour	0.0	7.3	16.7
plusieurs fois par jour	9.1	56.4	25.0
N**	11	55	12
données manquantes	10	30	12

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.3a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes & femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Hommes & femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*										
jamais	29.2	71.4	29.5	29.1	40.5	28.6	0.0	24.8	3.3	100.0
1 jour par semaine ou moins	8.2	0.0	8.9	25.3	24.3	5.7	100.0	22.0	1.6	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.5	14.3	12.9	22.8	13.5	2.9	0.0	16.3	2.5	0.0
4 à 6 jours par semaine	10.9	14.3	7.1	10.1	10.8	2.9	0.0	8.3	2.5	0.0
une fois par jour	7.7	0.0	17.4	4.4	2.7	11.4	0.0	6.0	4.1	0.0
plusieurs fois par jour	31.5	0.0	24.1	8.2	8.1	48.6	0.0	22.6	86.1	0.0
N**	2'422	7	224	158	37	35	5	762	122	2
données manquantes	1'284	6	136	97	24	24	3	253	15	62
Fréquence de consommation 6 derniers mois (%)*										
jamais	7.7	33.3	15.5	13.7	12.8	2.9	0.0	6.5	3.1	15.0
1 jour par semaine ou moins	7.4	0.0	9.9	26.1	38.5	5.9	83.3	28.8	0.8	5.0
2 à 3 jours par semaine	16.8	16.7	12.7	26.1	20.5	5.9	0.0	19.0	2.3	5.0
4 à 6 jours par semaine	13.6	16.7	7.5	16.8	12.8	2.9	0.0	9.9	2.3	0.0
une fois par jour	10.0	0.0	22.1	5.6	5.1	5.9	0.0	6.3	3.9	10.0
plusieurs fois par jour	44.5	33.3	32.4	11.8	10.3	76.5	16.7	29.4	87.5	65.0
N**	2'428	6	213	161	39	34	6	735	128	20
données manquantes	1'278	7	147	94	22	25	2	280	9	44

T15.3b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours et des 6 derniers mois avant l'admission (2012), hommes & femmes

Patientes: problème principal			
Hommes & femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*			
jamais	49.1	4.5	9.6
1 jour par semaine ou moins	15.8	7.5	9.6
2 à 3 jours par semaine	8.8	19.4	7.2
4 à 6 jours par semaine	12.3	9.0	2.4
1 fois par jour	7.0	7.5	13.3
plusieurs fois par jour	7.0	52.2	57.8
N**	57	67	83
données manquantes	41	25	45
Fréquence d'apparition au cours des 6 derniers mois (%)*			
jamais	17.0	0.0	2.6
1 jour par semaine ou moins	27.7	8.3	9.0
2 à 3 jours par semaine	12.8	16.7	11.5
4 à 6 jours par semaine	21.3	13.3	1.3
1 fois par jour	8.5	8.3	15.4
plusieurs fois par jour	12.8	53.3	60.3
N**	47	60	78
données manquantes	51	32	50

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), hommes

Patients: principale substance posant problème										
Hommes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	16.1	20.5	21.7	21.2	20.1	35.5	14.8	14.8	15.8	26.2
écart-type	3.6	5.0	5.8	5.3	6.1	13.7	2.6	2.2	3.5	16.5
1er quartile	14.0	17.0	18.0	18.0	17.0	21.0	13.0	14.0	13.0	17.0
valeur médiane	16.0	20.5	20.0	20.0	18.0	37.0	15.5	15.0	15.0	18.0
3e quartile	17.0	24.0	25.0	24.0	23.0	49.5	16.5	16.0	18.0	25.0
N*	1'035	2	144	101	18	8	4	582	45	5
données manquantes	1'519	9	133	108	28	19	3	228	33	39
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	22.8	21.0	23.3	23.1	21.6	32.3	15.0	15.9	16.9	23.0
écart-type	8.3	4.2	6.1	6.0	7.8	12.9	2.8	2.8	4.9	5.6
1er quartile	18.0	18.0	19.0	19.0	17.5	22.0	13.0	15.0	14.0	19.0
valeur médiane	20.0	21.0	21.5	21.0	18.0	24.0	16.0	15.0	16.0	24.0
3e quartile	25.0	24.0	26.5	25.0	24.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0
N*	1'083	2	136	93	16	7	4	482	42	5
données manquantes	1'471	9	141	116	30	20	3	328	36	39
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	32.8	21.7	24.3	24.4	21.5	32.0	16.7	16.7	19.1	33.3
écart-type	12.2	3.2	6.8	6.3	7.2	14.2	1.5	3.4	8.2	19.1
1er quartile	23.0	18.0	19.0	20.0	17.5	22.0	15.0	15.0	14.0	19.0
valeur médiane	30.0	23.0	23.0	23.0	19.0	26.0	17.0	16.0	17.0	26.0
3e quartile	40.0	24.0	28.0	29.0	21.5	38.0	18.0	17.0	20.0	55.0
N*	922	3	92	82	16	9	3	454	45	3
données manquantes	1'632	8	185	127	30	18	4	356	33	41
Période de latence (en années)**										
moyenne	25.9	.	9.5	8.3	3.4	6.8	0.6	5.2	9.5	18.7
écart-type	13.2	.	9.4	6.1	4.7	4.6	0.1	6.7	10.2	14.2
1er quartile	15.5	.	2.2	4.3	0.8	3.6	0.6	1.4	1.5	8.7
valeur médiane	25.6	.	7.0	6.9	1.1	6.8	0.6	2.8	6.1	18.7
3e quartile	35.2	.	14.0	11.7	4.5	10.1	0.7	5.8	12.0	28.8
N*	464	0	27	53	10	2	2	440	33	2
données manquantes	506	4	15	30	13	2	2	91	12	19

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), femmes

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.7	.	20.6	20.7	16.6	32.7	16.0	14.8	17.0	29.3
écart-type	5.3	.	6.3	5.7	1.5	11.3		1.9	3.4	25.7
1er quartile	15.0	.	17.0	17.0	15.5	24.0	16.0	14.0	15.0	14.0
valeur médiane	16.0	.	20.0	19.0	17.0	30.0	16.0	15.0	16.0	15.0
3e quartile	20.0	.	23.0	24.0	18.0	44.0	16.0	16.0	19.0	59.0
N*	411	0	44	26	8	10	1	158	37	3
données manquantes	741	2	39	20	7	22	0	47	22	17
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	27.3	.	22.7	22.1	17.1	38.3	16.0	16.2	18.4	16.5
écart-type	10.9	.	6.7	6.1	1.4	14.5		3.6	4.8	2.1
1er quartile	20.0	.	18.0	19.0	17.0	25.0	16.0	14.0	16.0	15.0
valeur médiane	24.0	.	21.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	17.5	16.5
3e quartile	35.0	.	25.0	24.5	18.0	50.0	16.0	16.0	20.0	18.0
N*	424	0	42	24	9	11	1	131	36	2
données manquantes	728	2	41	22	6	21	0	74	23	18
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.3	.	22.9	24.1	17.2	41.2	.	16.5	21.7	59.0
écart-type	12.8	.	6.3	7.2	1.4	14.4	.	3.0	10.5	
1er quartile	25.0	.	18.0	20.0	17.0	30.0	.	15.0	16.0	59.0
valeur médiane	35.0	.	23.0	22.5	17.5	37.5	.	16.0	20.0	59.0
3e quartile	44.0	.	26.0	27.0	18.0	50.0	.	17.0	22.0	59.0
N*	410	0	34	20	10	10	0	125	33	1
données manquantes	742	2	49	26	5	22	1	80	26	19
Période de latence (en années)**										
moyenne	24.6	.	6.5	7.7	2.3	10.1	2.4	4.9	21.9	15.1
écart-type	12.6	.	7.3	6.3	1.5	4.1		5.6	16.1	17.4
1er quartile	15.9	.	1.4	3.3	1.1	7.1	2.4	1.4	4.8	1.5
valeur médiane	25.0	.	5.3	4.4	1.9	9.3	2.4	2.6	23.3	9.2
3e quartile	33.6	.	7.6	10.7	3.1	13.2	2.4	5.9	35.6	34.7
N*	160	0	10	14	6	4	1	117	26	3
données manquantes	230	0	5	2	3	5	0	20	10	7

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Age lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2012), hommes & femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème											
<i>Hommes & femmes</i>	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation											
moyenne	16.6	20.5	21.4	21.1	19.0	33.9	15.0	14.8	16.3	27.4	
écart-type	4.2	5.0	5.9	5.4	5.4	12.1	2.4	2.1	3.5	18.6	
1er quartile	15.0	17.0	18.0	17.0	16.0	22.0	15.0	14.0	14.0	15.5	
valeur médiane	16.0	20.5	20.0	20.0	17.5	33.0	16.0	15.0	16.0	17.5	
3e quartile	18.0	24.0	24.0	24.0	19.0	48.0	16.0	16.0	19.0	40.0	
N*	1'446	2	188	127	26	18	5	740	82	8	
<i>données manquantes</i>	2'260	11	172	128	35	41	3	275	55	56	
Age lors du début de la consommation régulière											
moyenne	24.1	21.0	23.1	22.9	20.0	35.9	15.2	16.0	17.6	21.1	
écart-type	9.3	4.2	6.2	6.0	6.6	13.9	2.5	3.0	4.9	5.6	
1er quartile	18.0	18.0	19.0	19.0	17.0	24.0	15.0	15.0	14.0	16.0	
valeur médiane	20.0	21.0	21.0	21.0	18.0	30.0	16.0	15.0	17.0	19.0	
3e quartile	29.0	24.0	26.0	25.0	19.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0	
N*	1'507	2	178	117	25	18	5	613	78	7	
<i>données manquantes</i>	2'199	11	182	138	36	41	3	402	59	57	
Age lors du début de la consommation problématique											
moyenne	33.5	21.7	23.9	24.3	19.9	36.8	16.7	16.6	20.2	39.8	
écart-type	12.4	3.2	6.7	6.5	6.0	14.7	1.5	3.3	9.3	20.2	
1er quartile	23.0	18.0	19.0	20.0	17.0	25.0	15.0	15.0	15.0	22.5	
valeur médiane	32.0	23.0	23.0	23.0	18.0	32.0	17.0	16.0	18.0	40.5	
3e quartile	40.0	24.0	27.0	27.0	19.0	50.0	18.0	17.0	20.0	57.0	
N*	1'332	3	126	102	26	19	3	579	78	4	
<i>données manquantes</i>	2'374	10	234	153	35	40	5	436	59	60	
Période de latence (en années)**											
moyenne	25.6	.	8.7	8.2	3.0	9.0	1.2	5.1	15.0	16.6	
écart-type	13.0	.	8.8	6.1	3.8	4.2	1.0	6.5	14.4	14.3	
1er quartile	15.6	.	2.2	3.4	0.8	6.2	0.6	1.4	1.7	8.7	
valeur médiane	25.5	.	6.1	6.5	1.5	9.0	0.7	2.7	11.0	9.2	
3e quartile	34.6	.	9.1	11.7	4.1	10.7	2.4	5.9	24.8	28.8	
N*	624	0	37	67	16	6	3	557	59	5	
<i>données manquantes</i>	736	4	20	32	16	7	2	111	22	26	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), hommes

Patients: problème principal			
Hommes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	28.5	22.8	16.7
écart-type	14.0	14.2	8.0
1er quartile	18.5	10.5	13.0
valeur médiane	23.0	23.0	15.0
3e quartile	37.5	35.0	17.0
N*	24	4	37
<i>données manquantes</i>	53	3	67
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	31.2	22.4	19.2
écart-type	13.2	12.2	8.1
1er quartile	21.0	13.0	14.0
valeur médiane	29.0	20.0	16.0
3e quartile	40.0	34.0	21.0
N*	27	5	47
<i>données manquantes</i>	50	2	57
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	34.0	23.3	21.4
écart-type	14.3	10.5	9.9
1er quartile	24.0	13.0	15.0
valeur médiane	30.0	23.0	17.0
3e quartile	44.0	34.0	24.0
N*	29	3	50
<i>données manquantes</i>	48	4	54
Période de latence (en années)**			
moyenne	7.7	11.7	9.2
écart-type	4.8	3.4	8.6
1er quartile	4.8	9.0	2.8
valeur médiane	6.3	12.6	5.5
3e quartile	11.2	14.3	13.2
N*	24	4	37
<i>données manquantes</i>	53	3	67

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), femmes

Patientes: problème principal			
Femmes	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	40.2	15.5	18.6
écart-type	13.1	4.7	10.9
1er quartile	30.0	13.0	13.0
valeur médiane	43.0	16.0	15.0
3e quartile	50.0	18.0	15.0
N*	9	43	5
<i>données manquantes</i>	12	42	19
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	45.9	16.3	21.7
écart-type	11.7	4.4	9.1
1er quartile	43.0	14.0	15.0
valeur médiane	48.0	17.0	20.0
3e quartile	55.0	19.0	30.0
N*	10	43	7
<i>données manquantes</i>	11	42	17
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	47.7	17.9	25.1
écart-type	12.3	5.5	11.9
1er quartile	36.0	15.0	15.5
valeur médiane	49.0	17.0	19.0
3e quartile	56.0	19.0	39.0
N*	11	46	8
<i>données manquantes</i>	10	39	16
Période de latence (en années)**			
moyenne	11.4	10.4	5.1
écart-type	7.7	11.5	5.5
1er quartile	4.8	2.4	1.3
valeur médiane	9.4	5.6	2.5
3e quartile	17.2	15.6	6.7
N*	9	43	5
<i>données manquantes</i>	12	42	19

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Age lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2012), hommes & femmes

Patients: problème principal			
<i>Hommes & femmes</i>	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
Age lors de la première apparition			
moyenne	31.7	16.1	17.0
écart-type	14.5	6.1	8.3
1er quartile	19.0	12.0	13.0
valeur médiane	28.0	16.0	15.0
3e quartile	43.0	19.0	17.0
N*	33	47	42
<i>données manquantes</i>	65	45	86
Age lors du début de l'apparition régulière			
moyenne	35.2	17.0	19.5
écart-type	14.3	5.8	8.2
1er quartile	23.0	13.5	14.0
valeur médiane	31.0	17.0	16.0
3e quartile	48.0	19.5	21.0
N*	37	48	54
<i>données manquantes</i>	61	44	74
Age lors du début de l'apparition problématique			
moyenne	37.8	18.2	21.9
écart-type	15.0	5.9	10.2
1er quartile	25.5	15.0	15.0
valeur médiane	33.0	17.0	17.5
3e quartile	51.5	20.0	25.0
N*	40	49	58
<i>données manquantes</i>	58	43	70
Période de latence (en années)**			
moyenne	8.7	10.5	8.7
écart-type	5.8	11.0	8.3
1er quartile	4.8	2.6	2.5
valeur médiane	6.6	7.1	5.4
3e quartile	13.0	15.6	13.2
N*	33	47	42
<i>données manquantes</i>	65	45	86

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration de la principale substance posant problème au cours des 6 derniers mois avant l'admission (2012)

Patient-e-s: principale substance posant problème															
	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mode d'administration*															
injection	21.6	27.3	23.1	5.2	7.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
fumée/inhalation	49.5	45.5	48.5	17.7	14.3	16.9	8.3	14.3	10.5	98.1	97.8	98.1	12.5	0.0	5.9
ingestion (manger/boire)	2.1	0.0	1.5	2.1	3.6	2.4	33.3	42.9	36.8	1.1	1.4	1.2	62.5	88.9	76.5
sniff	26.8	27.3	26.9	75.0	75.0	75.0	58.3	42.9	52.6	0.4	0.7	0.4	25.0	0.0	11.8
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	5.9
N**	97	33	130	96	28	124	12	7	19	529	139	668	8	9	17
<i>données manquantes</i>	131	38	169	112	16	128	12	1	13	281	66	347	17	15	32

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 6 derniers mois avant l'admission des injections, échange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois avant l'admission et âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injections au cours de la vie*																
oui	5.0	4.8	4.9	61.7	58.5	60.9	12.7	31.0	16.1	5.8	4.3	5.5	9.3	7.7	8.9	338
non	95.0	95.2	95.1	38.3	41.5	39.1	87.3	69.0	83.9	94.2	95.7	94.5	90.7	92.3	91.1	3'481
N**	1'592	684	2'276	180	53	233	126	29	155	603	164	767	2'722	1'097	3'819	3'819
<i>données manquantes</i>	962	468	1'430	108	32	140	83	17	100	207	41	248	1'529	648	2'177	2'177
Injections au cours des 6 derniers mois*																
oui	0.3	0.3	0.3	27.0	25.5	26.6	7.9	7.1	7.8	4.5	3.1	4.2	3.2	2.0	2.8	108
non	99.7	99.7	99.7	73.0	74.5	73.4	92.1	92.9	92.2	95.5	96.9	95.8	96.8	98.0	97.2	3'685
N**	1'598	687	2'285	152	47	199	126	28	154	604	163	767	2'700	1'093	3'793	3'793
<i>données manquantes</i>	956	465	1'421	136	38	174	83	18	101	206	42	248	1'551	652	2'203	2'203
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.2	0.1	0.2	15.3	24.6	17.9	6.3	8.0	6.6	0.0	0.6	0.1	1.3	1.6	1.4	57
non	99.8	99.9	99.8	84.7	75.4	82.1	93.7	92.0	93.4	100.0	99.4	99.9	98.7	98.4	98.6	3'971
N**	1'710	740	2'450	150	57	207	126	25	151	611	165	776	2'852	1'176	4'028	4'028
<i>données manquantes</i>	844	412	1'256	138	28	166	83	21	104	199	40	239	1'399	569	1'968	1'968
Echange de matériel d'injection au cours des 6 derniers mois***																
oui	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	100.0	20.0	3.7	0.0	3.2	3.5	8.3	4.3	3
non	100.0	0.0	100.0	95.5	100.0	96.6	100.0	0.0	80.0	96.3	100.0	96.8	96.5	91.7	95.7	66
N**	3	0	3	22	7	29	4	1	5	27	4	31	57	12	69	69
<i>données manquantes</i>	1	2	3	13	3	16	4	1	5	0	1	1	19	7	26	26
Age lors de la première injection****																
jusqu'à 14 ans	5.0	16.7	7.7	0.0	18.8	3.8	0.0	14.3	7.7	0.0	0.0	0.0	1.7	16.2	5.2	8
de 15 à 16 ans	17.5	8.3	15.4	8.1	12.5	9.0	16.7	28.6	23.1	20.0	0.0	16.7	12.0	16.2	13.0	20
de 17 à 18 ans	15.0	33.3	19.2	24.2	25.0	24.4	16.7	0.0	7.7	0.0	100.0	16.7	19.7	24.3	20.8	32
de 19 à 20 ans	25.0	16.7	23.1	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	33.3	19.7	13.5	18.2	28
de 21 à 25 ans	30.0	8.3	25.0	32.3	25.0	30.8	33.3	42.9	38.5	20.0	0.0	16.7	29.9	21.6	27.9	43
de 26 à 30 ans	2.5	16.7	5.8	14.5	0.0	11.5	33.3	14.3	23.1	0.0	0.0	0.0	10.3	8.1	9.7	15
de 31 à 39 ans	2.5	0.0	1.9	6.5	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	0.0	3.9	6
dès 40 ans	2.5	0.0	1.9	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	2
N**	40	12	52	62	16	78	6	7	13	5	1	6	117	37	154	154
<i>données manquantes</i>	39	21	60	49	15	64	10	2	12	30	6	36	136	48	184	184

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 6 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), hommes
Hommes

	Patients: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	28.6	26.7	39.3	21.1	36.8	16.7	24.2	24.6	44.8
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	1.5	1.3	0.0	5.3	16.7	0.0	0.0	0.0
héroïne	1.9	14.3	6.3	8.7	0.0	42.1	33.3	1.3	1.6	3.4
méthadone	1.4	0.0	19.4	4.0	0.0	10.5	0.0	0.2	0.0	0.0
autres opiacés	0.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	0.0
cocaïne	5.1	14.3	28.2	0.0	23.7	21.1	50.0	6.5	1.6	13.8
crack, freebase	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0
amphétamines	1.1	0.0	5.3	6.0	15.8	5.3	16.7	3.6	1.6	3.4
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.2	0.0	4.4	10.0	18.4	0.0	33.3	3.7	0.0	3.4
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.2	14.3	11.7	4.0	2.6	0.0	16.7	0.5	1.6	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.6	0.0	2.4	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.4
LSD	0.7	0.0	1.5	4.7	5.3	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.0	0.0	2.7	0.0	10.5	16.7	0.8	0.0	0.0
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
cannabis	12.3	0.0	28.2	32.7	39.5	26.3	50.0	-	14.8	31.0
tabac	30.4	14.3	28.6	34.7	28.9	10.5	16.7	39.3	-	6.9
autres substances	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3.4
troubles alimentaires	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	5.3	0.0	0.2	1.6	3.4
autres troubles assimilables à une addiction	0.8	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	0.0
aucun autre problème addictif	57.4	28.6	26.2	25.3	23.7	31.6	16.7	43.1	59.0	34.5
N**	1'650	7	206	150	38	19	6	615	61	29
<i>données manquantes</i>	<i>904</i>	<i>4</i>	<i>71</i>	<i>59</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>195</i>	<i>17</i>	<i>15</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), femmes
Femmes

	Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	0.0	18.8	31.3	45.5	28.6	0.0	26.5	17.9	46.2
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
héroïne	1.7	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
méthadone	1.3	0.0	12.5	9.4	0.0	14.3	0.0	0.6	0.0	0.0
autres opiacés	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
cocaïne	2.9	0.0	21.9	0.0	45.5	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.7	0.0	1.6	12.5	9.1	0.0	0.0	6.0	0.0	7.7
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.3	0.0	3.1	15.6	36.4	0.0	100.0	7.8	0.0	7.7
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.3	0.0	15.6	6.3	9.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.9	0.0	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	1.6	3.1	9.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	100.0	0.6	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
cannabis	5.1	100.0	20.3	28.1	45.5	9.5	100.0	-	10.3	0.0
tabac	28.2	0.0	25.0	25.0	45.5	0.0	0.0	42.8	-	7.7
autres substances	0.4	0.0	0.0	0.0	9.1	9.5	0.0	0.6	0.0	-
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
troubles alimentaires	2.2	0.0	3.1	9.4	9.1	9.5	0.0	0.0	2.6	0.0
autres troubles assimilables à une addiction	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	61.0	0.0	35.9	28.1	18.2	42.9	0.0	43.4	69.2	38.5
N**	687	1	64	32	11	21	1	166	39	13
<i>données manquantes</i>	465	1	19	14	4	11	0	39	20	7

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2012), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*										
alcool	-	25.0	24.8	37.9	26.5	32.5	14.3	24.7	22.0	45.2
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	-	1.9	1.6	0.0	2.5	14.3	0.1	0.0	0.0
héroïne	1.8	12.5	6.3	9.3	0.0	20.0	28.6	1.2	2.0	2.4
méthadone	1.4	0.0	17.8	4.9	0.0	12.5	0.0	0.3	0.0	0.0
autres opiacés	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	2.5	0.0	0.9	1.0	0.0
cocaïne	4.5	12.5	26.7	0.0	28.6	10.0	42.9	6.5	1.0	9.5
crack, freebase	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0
amphétamines	1.0	0.0	4.4	7.1	14.3	2.5	14.3	4.1	1.0	4.8
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.2	0.0	4.1	11.0	22.4	0.0	42.9	4.6	0.0	4.8
autres stimulants	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.6	12.5	12.6	4.4	4.1	0.0	14.3	0.5	1.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	1.0	0.0	3.3	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4
LSD	0.6	0.0	1.5	4.4	6.1	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.2	0.0	0.0	2.2	2.0	5.0	28.6	0.8	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
cannabis	10.2	12.5	26.3	31.9	40.8	17.5	57.1	-	13.0	21.4
tabac	29.8	12.5	27.8	33.0	32.7	5.0	14.3	40.1	-	7.1
autres substances	0.3	0.0	0.7	0.0	2.0	5.0	0.0	0.6	0.0	-
jeu pathologique	0.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.3	0.0	4.8
troubles alimentaires	0.8	0.0	1.1	2.2	2.0	7.5	0.0	0.1	2.0	2.4
autres troubles assimilables à une addiction	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	0.0
aucun autre problème addictif	58.5	25.0	28.5	25.8	22.4	37.5	14.3	43.1	63.0	35.7
N**	2'337	8	270	182	49	40	7	781	100	42
<i>données manquantes</i>	<i>1'369</i>	<i>5</i>	<i>90</i>	<i>73</i>	<i>12</i>	<i>19</i>	<i>1</i>	<i>234</i>	<i>37</i>	<i>22</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), hommes

Hommes

	Patients: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	6.4	0.0	4.9
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	0.0	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	1.6
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	4.3	0.0	8.2
tabac	21.3	0.0	11.5
autres substances	2.1	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	1.6
troubles alimentaires	0.0	-	1.6
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	0.0	-
aucun autre problème addictif	72.3	100.0	78.7
N**	47	6	61
<i>données manquantes</i>	30	1	43

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), femmes

Femmes

	Patientes: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	10.0	7.5	0.0
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	1.9	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	3.8	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	1.9	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	1.9	0.0
tabac	10.0	9.4	6.7
autres substances	0.0	0.0	13.3
jeu pathologique	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	-	6.7
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	1.9	-
aucun autre problème addictif	80.0	83.0	80.0
N**	10	53	15
<i>données manquantes</i>	11	32	9

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2012), hommes & femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal		
	Jeu pathologique	Troubles alimentaires	Autres troubles assimilables à une addiction
	%	%	%
Autres problèmes*			
alcool	7.0	6.8	3.9
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.0	0.0	0.0
héroïne	0.0	1.7	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0
autres opiacés	0.0	0.0	0.0
cocaïne	0.0	3.4	0.0
crack, freebase	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	1.7	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	1.3
LSD	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0
cannabis	3.5	1.7	6.6
tabac	19.3	8.5	10.5
autres substances	1.8	0.0	2.6
jeu pathologique	-	0.0	1.3
troubles alimentaires	0.0	-	2.6
autres troubles assimilables à une addiction	0.0	1.7	-
aucun autre problème addictif	73.7	84.7	78.9
N**	57	59	76
<i>données manquantes</i>	41	33	52

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	12.1	11.0	11.8	14.4	22.0	16.1	11.5	8.0	10.9	13.3	16.5	14.0	13.2	14.0	13.5	491
1 fois par mois ou moins	3.6	4.8	3.9	14.4	31.7	18.3	7.7	12.0	8.5	22.9	26.8	23.7	8.9	9.7	9.1	332
2 à 4 fois par mois	5.0	7.0	5.6	24.5	24.4	24.4	21.2	24.0	21.7	42.4	43.3	42.5	15.5	15.0	15.4	561
2 à 3 fois par semaine	17.4	15.9	17.0	18.0	14.6	17.2	36.5	28.0	34.9	16.5	9.4	15.1	17.8	14.7	16.9	618
4 fois ou plus par semaine	61.9	61.4	61.7	28.8	7.3	23.9	23.1	28.0	24.0	4.9	3.9	4.7	44.5	46.6	45.1	1'646
N**	1'706	730	2'436	139	41	180	104	25	129	510	127	637	2'627	1'021	3'648	3'648
<i>données manquantes</i>	848	422	1'270	149	44	193	105	21	126	300	78	378	1'624	724	2'348	2'348
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	7.1	7.7	7.3	42.7	55.6	45.4	37.8	31.8	36.5	51.7	57.1	52.7	20.4	20.3	20.4	615
3 ou 4	17.6	18.4	17.8	29.1	29.6	29.2	26.8	40.9	29.8	32.9	32.7	32.9	22.1	21.6	22.0	663
5 ou 6	23.0	25.6	23.7	12.6	11.1	12.3	19.5	4.5	16.3	10.7	7.1	10.0	19.6	21.0	20.0	603
7 à 9	20.2	24.3	21.4	7.8	3.7	6.9	7.3	4.5	6.7	3.6	3.1	3.5	15.1	18.6	16.1	485
10 ou plus	32.2	24.1	29.8	7.8	0.0	6.2	8.5	18.2	10.6	1.2	0.0	1.0	22.7	18.5	21.6	650
N**	1'468	614	2'082	103	27	130	82	22	104	422	98	520	2'188	828	3'016	3'016
<i>données manquantes</i>	1'086	538	1'624	185	58	243	127	24	151	388	107	495	2'063	917	2'980	2'980
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	12.9	15.1	13.5	42.3	61.8	46.9	26.5	45.8	30.8	48.8	50.9	49.2	24.1	27.6	25.1	821
moins d'une fois par mois	10.2	10.6	10.3	21.6	11.8	19.3	27.7	20.8	26.2	29.8	33.6	30.6	15.7	14.1	15.2	499
1 fois par mois	11.3	8.7	10.5	10.8	8.8	10.3	18.1	4.2	15.0	13.4	8.2	12.3	11.9	8.2	10.8	355
1 fois par semaine	24.6	25.8	25.0	15.3	14.7	15.2	21.7	8.3	18.7	6.5	7.3	6.6	20.0	20.7	20.2	660
presque chaque jour	41.0	39.9	40.7	9.9	2.9	8.3	6.0	20.8	9.3	1.6	0.0	1.3	28.4	29.4	28.7	940
N**	1'579	644	2'223	111	34	145	83	24	107	449	110	559	2'370	905	3'275	3'275
<i>données manquantes</i>	975	508	1'483	177	51	228	126	22	148	361	95	456	1'881	840	2'721	2'721

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T21 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	29.7	33.6	30.8	3.8	4.9	4.1	14.4	4.2	12.3	18.5	10.7	16.9	25.0	27.7	25.8	693
1 jour par semaine ou moins	1.2	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2.6	3.6	3.3	3.5	1.8	0.9	1.5	41
2 à 3 jours par semaine	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.9	4.2	2.5	3.9	1.3	1.2	1.3	34
4 à 6 jours par semaine	0.8	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.7	2.4	1.2	0.7	1.0	28
1 fois par jour	1.2	0.4	1.0	1.9	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	1.2	0.9	1.2	31
plusieurs fois par jour	66.8	64.9	66.2	94.3	92.7	93.9	83.3	87.5	84.2	69.4	80.2	71.6	69.5	68.7	69.3	1'864
N**	1'087	453	1'540	106	41	147	90	24	114	471	121	592	1'925	766	2'691	2'691
<i>données manquantes</i>	1'467	699	2'166	182	44	226	119	22	141	339	84	423	2'326	979	3'305	3'305
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	16.8	19.2	17.5	9.6	18.9	12.5	23.9	38.9	27.0	53.9	45.5	52.0	27.7	25.4	27.1	479
11 à 20	41.5	50.2	43.9	44.6	48.6	45.8	45.1	44.4	44.9	35.0	42.4	36.6	40.2	48.2	42.4	749
21 à 30	30.9	24.7	29.2	32.5	18.9	28.3	19.7	11.1	18.0	9.5	11.1	9.8	23.7	20.5	22.8	403
31 ou plus	10.8	5.9	9.4	13.3	13.5	13.3	11.3	5.6	10.1	1.7	1.0	1.6	8.4	5.9	7.7	137
N**	667	255	922	83	37	120	71	18	89	349	99	448	1'280	488	1'768	1'768
<i>données manquantes</i>	97	46	143	19	2	21	6	5	11	35	9	44	164	66	230	230

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème										
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*										
abstinence définitive	31.8	100.0	75.0	80.8	66.7	58.3	50.0	48.3	46.2	46.7
abstinence limitée dans le temps	25.4	0.0	4.0	6.4	16.7	0.0	0.0	9.0	7.7	0.0
consommation contrôlée	30.0	0.0	6.5	5.1	8.3	8.3	0.0	20.9	30.8	33.3
aucune limitation envisagée	1.3	0.0	0.8	1.3	0.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.4	0.0	12.9	6.4	8.3	25.0	50.0	15.8	15.4	20.0
autre	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
N**	1'025	2	124	78	12	12	2	234	13	15
<i>données manquantes</i>	1'529	9	153	131	34	15	5	576	65	29

T22b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	34.2	0.0	75.0	70.0	20.0	66.7	100.0	50.0	50.0	66.7
abstinence limitée dans le temps	20.8	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
consommation contrôlée	31.9	0.0	3.1	5.0	20.0	22.2	0.0	23.3	0.0	16.7
aucune limitation envisagée	0.7	0.0	9.4	0.0	0.0	11.1	0.0	1.7	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.6	0.0	9.4	20.0	60.0	0.0	0.0	16.7	50.0	16.7
autre	0.7	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	404	0	32	20	5	9	1	60	2	6
<i>données manquantes</i>	748	2	51	26	10	23	0	145	57	14

T22c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2012), hommes & femmes

Objectif de consommation*										
abstinence définitive	32.5	100.0	75.0	78.6	52.9	61.9	66.7	48.6	46.7	52.4
abstinence limitée dans le temps	24.1	0.0	3.2	6.1	11.8	0.0	0.0	8.8	6.7	0.0
consommation contrôlée	30.5	0.0	5.8	5.1	11.8	14.3	0.0	21.4	26.7	28.6
aucune limitation envisagée	1.1	0.0	2.6	1.0	0.0	9.5	0.0	4.8	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.5	0.0	12.2	9.2	23.5	14.3	33.3	16.0	20.0	19.0
autres	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
N**	1'429	2	156	98	17	21	3	294	15	21
<i>données manquantes</i>	2'277	11	204	157	44	38	5	721	122	43

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23a Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), hommes
Hommes

	Patients: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	33.2	100.0	44.2	25.0	11.1	55.6	50.0	22.1	10.0	71.4
états anxieux/tension nerv. importants	26.8	100.0	37.9	17.9	44.4	77.8	50.0	20.5	0.0	50.0
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	13.0	0.0	23.2	8.9	33.3	33.3	25.0	18.9	20.0	21.4
hallucinations	2.6	0.0	8.4	7.1	11.1	0.0	25.0	4.2	10.0	7.1
diffic. à contrôler comportement violent	13.9	100.0	17.9	19.6	11.1	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
problèmes psychiques traités avec médic.	12.6	0.0	9.5	12.5	0.0	66.7	0.0	6.3	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	14.6	100.0	18.9	14.3	33.3	22.2	25.0	13.2	0.0	28.6
tentatives de suicide	5.5	0.0	9.5	7.1	11.1	0.0	0.0	6.8	0.0	21.4
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.5	0.0	2.1	5.4	0.0	0.0	0.0	4.2	10.0	0.0
aucun	39.2	0.0	27.4	42.9	44.4	11.1	25.0	55.8	60.0	14.3
N**	779	1	95	56	9	9	4	190	10	14
<i>données manquantes</i>	<i>1'775</i>	<i>10</i>	<i>182</i>	<i>153</i>	<i>37</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>620</i>	<i>68</i>	<i>30</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23b Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), femmes
Femmes

	Patientes: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaine et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépansions sévères	44.3	0.0	36.0	41.2	0.0	77.8	0.0	32.7	0.0	57.1
états anxieux/tension nerv. importants	42.7	0.0	48.0	41.2	0.0	66.7	0.0	30.8	0.0	42.9
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	15.3	0.0	8.0	17.6	0.0	44.4	0.0	17.3	0.0	42.9
hallucinations	2.2	0.0	0.0	5.9	0.0	11.1	0.0	5.8	0.0	14.3
diffic. à contrôler comportement violent	7.6	0.0	8.0	17.6	0.0	11.1	0.0	23.1	0.0	14.3
problèmes psychiques traités avec médic.	24.5	0.0	20.0	23.5	100.0	22.2	0.0	17.3	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	20.7	0.0	32.0	17.6	50.0	66.7	0.0	26.9	0.0	57.1
tentatives de suicide	13.1	0.0	12.0	11.8	0.0	66.7	0.0	13.5	0.0	28.6
autre(s) problème(s) psychique(s)	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
aucun	22.3	0.0	24.0	23.5	0.0	0.0	100.0	40.4	100.0	28.6
N**	314	0	25	17	2	9	1	52	1	7
<i>données manquantes</i>	838	2	58	29	13	23	0	153	58	13

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T23c Problèmes psychiques au cours de la vie (2012), hommes & femmes
Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal									
	Alcool	Cocktails	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Médicaments	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*										
dépressions sévères	36.4	100.0	42.5	28.8	9.1	66.7	40.0	24.4	9.1	66.7
états anxieux/tension nerv. importants	31.4	100.0	40.0	23.3	36.4	72.2	40.0	22.7	0.0	47.6
diffic. compréhension/mémoire/concentr.	13.6	0.0	20.0	11.0	27.3	38.9	20.0	18.6	18.2	28.6
hallucinations	2.5	0.0	6.7	6.8	9.1	5.6	20.0	4.5	9.1	9.5
diffic. à contrôler comportement violent	12.1	100.0	15.8	19.2	9.1	5.6	0.0	19.0	0.0	38.1
problèmes psychiques traités avec médic.	16.0	0.0	11.7	15.1	18.2	44.4	0.0	8.7	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	16.4	100.0	21.7	15.1	36.4	44.4	20.0	16.1	0.0	38.1
tentatives de suicide	7.7	0.0	10.0	8.2	9.1	33.3	0.0	8.3	0.0	23.8
autre(s) problème(s) psychique(s)	3.9	0.0	1.7	4.1	0.0	0.0	0.0	3.7	9.1	0.0
aucun	34.3	0.0	26.7	38.4	36.4	5.6	40.0	52.5	63.6	19.0
N**	1'093	1	120	73	11	18	5	242	11	21
<i>données manquantes</i>	<i>2'613</i>	<i>12</i>	<i>240</i>	<i>182</i>	<i>50</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>773</i>	<i>126</i>	<i>43</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24 Proches: Lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2012)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
lien avec la tierce personne*				
mère/père	37.1	31.2	32.6	338
filles/fils	17.2	13.6	14.2	147
sœur/frère	6.8	4.6	5.0	52
conjoint-e/partenaire	29.9	45.1	41.2	427
autre proche/parent-e	1.4	2.0	1.8	19
collègue/ami-e	3.6	1.6	2.0	21
employeur/se, enseignant-e	0.9	0.2	0.4	4
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	3.2	1.6	2.7	28
N**	221	801	1'036	1'036
<i>données manquantes</i>	7	16	23	23

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: problème principal et autres problèmes de la tierce personne (2012)

Proches				
Total			Total	
	%	N	%	N
Problème principal de la tierce personne*			Autres problèmes de la tierce personne***	
alcool	63.6	663	alcool	32.5 130
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.4	4	cocktails (héroïne et cocaïne)	0.5 2
héroïne	2.7	28	héroïne	2.8 11
méthadone	0.7	7	méthadone	3.8 15
autres opiacés (morphine, codéine, etc)	0.1	1	autres opiacés (morphine, codéine, etc)	1.3 5
cocaïne	5.5	57	cocaïne	8.8 35
crack, feebase	0.0	0	crack, feebase	0.3 1
amphétamines	0.4	4	amphétamines	2.0 8
MDMA et substances similaires (ecstasy)	1.0	10	MDMA et substances similaires (ecstasy)	2.8 11
autres stimulants (khat, etc)	0.1	1	autres stimulants (khat, etc)	0.5 2
barbituriques	1.6	17	barbituriques	0.3 1
benzodiazépines	0.4	4	benzodiazépines	2.8 11
autres somnifères et tranquillisants	0.1	1	autres somnifères et tranquillisants	2.5 10
LSD	0.0	0	LSD	2.0 8
autres hallucinogènes	0.4	4	autres hallucinogènes	0.3 1
substances volatiles (solvants, etc)	0.0	0	substances volatiles (solvants, etc)	0.0 0
cannabis	12.8	133	cannabis	18.0 72
tabac	0.8	8	tabac	21.5 86
autre substance	0.5	5	autre substance	0.5 2
jeu pathologique	3.1	32	jeu pathologique	4.5 18
troubles alimentaires	1.5	16	troubles alimentaires	0.8 3
autre comportement de type addictif	4.5	47	autre comportement de type addictif	5.0 20
			aucun	22.5 90
N**		1'042	N**	400
<i>données manquantes</i>		17	<i>données manquantes</i>	659

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

*** Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T26 Proches: Propres problèmes des proches liés au problème de la tierce personne (2012)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
propres problèmes*				
propres probl. de consom. de substances	12.0	10.8	11.0	40
propres comportements de type addictif	0.0	1.0	0.8	3
propres problèmes somatiques	0.0	6.6	5.2	19
propres problèmes psychiques	14.7	35.2	30.9	112
problèmes de couple	34.7	40.8	39.5	143
problèmes familiaux	53.3	54.0	53.9	195
problèmes financiers	9.3	14.3	13.3	48
problèmes liés à la profession/formation	2.7	4.5	4.1	15
problèmes de logement	9.3	8.7	8.8	32
problèmes de violence (victime)	2.7	8.4	7.2	26
problèmes à contrôler sa propre violence	2.7	0.7	1.1	4
problèmes juridiques	4.0	4.2	4.1	15
autre	1.3	3.1	2.8	10
aucun	18.7	13.2	14.4	52
N**	75	287	362	362
<i>données manquantes</i>	153	530	697	697

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes	69.9			73.4			83.3			80.7			21.1			64.1		4'425	
femmes	30.1			26.6			16.7			19.3			78.8			35.9		2'478	
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0		1	
N**	2'560	1'100	3'660	325	118	443	249	50	299	718	172	890	214	798	1'013	4'425	2'478	6'904	6'904
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.9	1.7	2.7	4.7	0.6	1.5	1.2	0.8	1.0	72
15-19	1.9	1.0	1.7	0.3	0.8	0.5	2.4	8.0	3.3	55.8	55.8	55.8	4.2	2.7	3.0	11.6	7.1	10.0	685
20-24	3.6	2.0	3.1	5.9	16.9	8.8	16.1	26.0	17.7	15.3	18.6	16.0	4.7	3.8	4.0	7.3	5.9	6.8	464
25-29	8.1	4.2	7.0	17.3	18.6	17.6	21.3	32.0	23.1	11.3	9.3	10.9	4.7	6.8	6.4	10.3	7.5	9.3	638
30-34	10.0	6.6	9.0	19.4	17.8	19.0	23.3	8.0	20.7	6.3	5.2	6.1	9.3	8.2	8.4	11.1	8.0	10.0	686
35-39	9.6	8.7	9.3	24.4	15.3	21.9	15.7	8.0	14.4	3.8	3.5	3.7	7.9	11.4	10.6	10.2	9.6	9.9	683
40-44	14.8	13.9	14.5	16.4	16.1	16.3	11.2	4.0	10.0	2.0	2.9	2.1	7.9	14.8	13.3	11.8	13.0	12.2	839
45-49	14.8	18.1	15.8	9.0	10.2	9.3	6.8	4.0	6.4	1.7	1.2	1.6	15.4	16.3	16.1	11.0	14.5	12.3	841
50-54	12.8	17.0	14.0	4.6	2.5	4.1	1.6	4.0	2.0	0.6	1.7	0.8	13.1	15.5	15.0	9.1	13.4	10.7	733
55-59	10.7	11.1	10.8	2.5	0.8	2.0	1.6	4.0	2.0	0.1	0.0	0.1	11.7	8.2	8.9	7.4	8.5	7.8	536
60-64	6.0	8.7	6.8	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	6.1	4.4	4.8	3.9	5.5	4.5	308
65-69	4.5	4.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.6	2.9	3.5	3.1	3.3	3.1	215
70-74	1.8	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.6	1.2	2.0	1.5	101
75 et plus	1.1	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.5	1.9	0.8	1.1	0.9	64
N**	2'547	1'083	3'630	324	118	442	249	50	299	717	172	889	214	792	1'006	4'410	2'455	6'865	6'865
données manquantes	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	39
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.4	48.2	46.3	37.0	34.6	36.4	33.1	29.7	32.6	22.4	22.4	22.4	45.2	45.0	45.0	39.4	43.1	40.8	
écart-type	13.0	12.3	12.9	8.3	9.3	8.6	8.5	10.4	8.9	8.0	8.4	8.1	16.1	13.2	13.8	14.9	14.5	14.9	
1er quartile	35.6	40.8	37.1	30.4	27.7	29.8	26.6	22.2	25.8	17.2	16.7	17.1	34.6	36.1	35.7	27.6	32.4	29.0	
valeur médiane	45.6	48.4	46.5	36.6	32.7	36.3	32.1	27.1	31.0	18.7	18.4	18.6	46.6	45.6	45.8	39.3	44.4	41.4	
3e quartile	54.6	56.1	55.1	42.2	42.0	42.1	38.9	33.5	38.6	25.4	24.7	25.2	57.0	52.5	53.4	50.4	53.0	51.6	
N**	2'547	1'083	3'630	324	118	442	249	50	299	717	172	889	214	792	1'006	4'410	2'455	6'865	
données manquantes	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
État civil*																			
célibataire	40.9	29.0	37.4	71.9	72.0	71.9	73.8	87.2	75.9	92.7	92.4	92.6	31.9	23.6	25.4	54.5	37.8	48.4	2'928
marié-e	31.9	27.5	30.6	11.9	14.0	12.4	13.8	7.7	12.9	4.2	3.2	4.0	51.9	52.7	52.5	25.5	32.4	28.0	1'693
séparé-e	5.4	7.2	5.9	3.3	2.0	3.0	4.3	5.1	4.4	1.1	0.6	1.0	3.2	4.6	4.3	4.1	5.1	4.5	269
divorcé-e	19.5	30.5	22.8	12.2	8.0	11.1	6.2	0.0	5.2	1.8	3.2	2.1	9.2	16.2	14.7	14.1	20.6	16.4	994
veuf/veuve	1.8	5.3	2.8	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	2.7	2.4	2.5	1.2	3.6	2.1	126
partenariat enregistré	0.4	0.5	0.5	0.7	3.0	1.4	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	34
N**	2'254	960	3'214	270	100	370	210	39	249	613	158	771	185	711	897	3'854	2'189	6'044	6'044
données manquantes	306	140	446	55	18	73	39	11	50	105	14	119	29	87	116	571	289	860	860
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	7.8	8.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9.4	9.1	9.2	5.1	6.7	5.7	355
périphérie des grands centres	12.9	15.0	13.5	2.6	3.1	2.8	4.2	13.2	5.6	2.9	6.3	3.6	16.3	14.2	14.6	9.7	12.5	10.7	670
villes de moyenne importance	13.7	12.8	13.4	10.6	22.4	13.8	21.0	13.2	19.8	28.0	22.2	26.8	15.3	15.9	15.8	16.5	16.2	16.3	1'020
petites villes	34.8	32.2	34.0	59.6	48.0	56.5	50.9	57.9	52.0	35.0	39.9	36.0	36.1	33.1	33.8	38.2	34.6	36.9	2'303
campagne	30.8	31.7	31.0	27.2	26.5	27.0	23.8	15.8	22.6	33.9	31.6	33.4	22.8	27.7	26.6	30.5	30.0	30.3	1'893
N**	2'349	995	3'344	265	98	363	214	38	252	611	158	769	202	747	950	3'980	2'260	6'241	6'241
données manquantes	211	105	316	60	20	80	35	12	47	107	14	121	12	51	63	445	218	663	663

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	39.3	38.0	39.0	47.4	28.8	41.8	33.1	26.9	32.1	14.6	12.8	14.2	16.7	12.1	12.9	33.1	26.4	30.7	1'336
avec un ou les parents	5.9	2.2	4.8	9.7	7.6	9.1	12.5	34.6	16.0	68.6	59.4	66.6	14.0	5.6	7.3	19.3	10.7	16.2	706
avec enfant(s), sans partenaire	2.2	11.5	5.0	3.2	13.6	6.4	1.5	7.7	2.5	0.4	1.5	0.7	7.0	14.5	13.1	2.0	11.0	5.3	232
avec partenaire, sans enfant	26.2	29.3	27.1	12.3	24.2	15.9	19.9	3.8	17.3	4.4	9.0	5.4	28.1	26.2	26.5	20.6	25.3	22.3	971
avec partenaire et enfant(s)	18.2	14.1	17.0	9.7	15.2	11.4	19.1	0.0	16.0	2.5	5.3	3.1	31.6	40.5	38.8	15.8	21.3	17.8	775
avec d'autres proches	1.1	0.7	1.0	2.6	0.0	1.8	0.7	0.0	0.6	1.9	0.8	1.6	1.8	0.4	0.6	1.4	0.6	1.1	49
avec des amis (colocation)	2.3	1.2	2.0	3.2	6.1	4.1	5.1	7.7	5.6	1.9	2.3	2.0	0.9	0.6	0.6	2.5	1.7	2.2	95
autre	4.7	2.9	4.2	11.7	4.5	9.5	8.1	19.2	9.9	5.6	9.0	6.4	0.0	0.2	0.2	5.2	3.0	4.4	192
N**	1'645	686	2'331	154	66	220	136	26	162	478	133	611	114	504	619	2'761	1'594	4'356	4'356
données manquantes	915	414	1'329	171	52	223	113	24	137	240	39	279	100	294	394	1'664	884	2'548	2'548
Situation de domicile*																			
domicile fixe	93.1	95.4	93.8	79.7	79.2	79.5	90.0	88.2	89.7	93.0	86.4	91.7	96.5	97.9	97.6	92.5	94.6	93.3	4'499
sans domicile fixe	4.9	3.1	4.4	12.1	19.4	14.2	6.9	8.8	7.2	4.6	10.7	5.8	3.5	2.1	2.4	5.2	4.2	4.8	233
institution	1.9	1.5	1.8	8.2	1.4	6.3	3.1	2.9	3.1	2.4	2.9	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	1.9	92
N**	1'804	744	2'548	182	72	254	160	34	194	544	140	684	142	571	714	3'073	1'750	4'824	4'824
données manquantes	756	356	1'112	143	46	189	89	16	105	174	32	206	72	227	299	1'352	728	2'080	2'080
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	31.8	33.7	32.4	40.6	31.1	37.1	31.5	43.8	33.1	71.7	40.2	64.4	16.0	16.9	16.9	37.9	29.7	34.8	1'235
relations temporaires	4.0	4.6	4.2	4.7	8.2	6.0	5.6	18.8	7.3	5.6	13.4	7.4	2.1	0.5	0.8	4.2	4.3	4.2	150
partenaire fixe, vivant séparé	10.4	11.4	10.7	10.4	16.4	12.6	18.5	12.5	17.7	12.1	25.8	15.3	8.5	7.3	7.5	10.8	11.3	11.0	389
partenaire fixe, ménage commun	53.8	50.3	52.8	44.3	44.3	44.3	44.4	25.0	41.9	10.6	20.6	12.9	73.4	75.3	74.8	47.1	54.7	50.0	1'774
N**	1'380	612	1'992	106	61	167	108	16	124	322	97	419	94	437	532	2'182	1'365	3'548	3'548
données manquantes	1'180	488	1'668	219	57	276	141	34	175	396	75	471	120	361	481	2'243	1'113	3'356	3'356

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Plus haute formation achevée, source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune form. achevée	5.9	8.6	6.6	9.7	4.8	8.3	6.4	15.4	7.8	19.2	17.3	18.8	9.1	5.2	6.0	9.8	8.2	9.2	371
scolarité obligatoire	12.1	11.1	11.8	32.9	45.2	36.4	20.7	42.3	24.1	54.1	58.6	55.1	10.0	11.9	11.7	22.1	19.4	21.2	849
scolarité complémentaire	2.4	5.1	3.2	3.9	8.1	5.1	3.6	0.0	3.0	4.8	5.3	4.9	1.8	4.8	4.1	2.9	5.2	3.7	149
apprentissage/école prof.	59.9	54.6	58.4	45.8	38.7	43.8	58.6	34.6	54.8	18.8	17.3	18.5	44.5	50.1	48.9	49.1	47.3	48.5	1'945
maturité/diplôme	4.2	3.6	4.0	1.9	1.6	1.8	2.9	3.8	3.0	1.0	0.8	1.0	7.3	6.4	6.6	3.9	4.9	4.2	170
école normale, pédagog.	0.7	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	3.6	3.6	3.6	0.6	1.8	1.0	42
form. profession. supérieure	6.3	6.1	6.3	3.2	1.6	2.8	6.4	3.8	6.0	1.7	0.0	1.3	8.2	8.6	8.5	5.3	5.9	5.5	219
école profession. supérieure	1.1	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.4	0.8	0.6	0.7	30
haute école spécialisée	2.6	2.6	2.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	3.2	1.8	2.2	1.9	77
université, haute école	4.9	5.5	5.1	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	10.9	6.2	7.1	3.7	4.5	4.0	160
N**	1'517	604	2'121	155	62	217	140	26	166	479	133	612	110	421	532	2'627	1'384	4'012	4'012
données manquantes	1'043	496	1'539	170	56	226	109	24	133	239	39	278	104	377	481	1'798	1'094	2'892	2'892
Source de revenu principale*																			
salaires	60.6	43.3	55.5	36.9	29.5	34.7	65.0	35.9	59.8	29.7	21.4	28.0	72.2	60.6	62.9	54.0	46.5	51.3	2'671
économies, épargne	1.1	0.6	0.9	0.0	1.3	0.4	0.6	2.6	0.9	0.5	0.7	0.6	0.0	0.2	0.1	0.8	0.5	0.7	37
rente (AVS, AI ou autre)	15.7	21.5	17.4	16.0	14.1	15.5	9.4	10.3	9.6	4.1	9.0	5.1	13.3	11.0	11.5	12.7	16.3	14.0	730
aide sociale	12.8	14.0	13.2	31.0	42.3	34.3	12.2	23.1	14.2	9.5	12.4	10.1	1.9	2.5	2.3	12.6	10.8	11.9	621
assurance-chômage	5.8	4.2	5.3	8.0	1.3	6.0	5.6	2.6	5.0	1.6	2.8	1.8	0.6	1.3	1.2	4.8	2.9	4.1	215
soutien du/de la partenaire	0.9	13.1	4.5	0.5	5.1	1.9	0.6	2.6	0.9	0.5	1.4	0.7	0.6	18.8	15.0	0.8	12.9	5.2	272
soutien parents/proches/amis	2.3	2.4	2.4	4.8	5.1	4.9	3.9	20.5	6.8	54.1	51.7	53.6	10.1	5.3	6.4	13.3	9.5	11.9	621
deal, combines	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	4
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	0.7	0.9	0.8	0.5	1.3	0.8	2.2	2.6	2.3	0.0	0.7	0.1	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	34
N**	1'933	819	2'752	187	78	265	180	39	219	579	145	724	158	607	766	3'322	1'885	5'208	5'208
données manquantes	627	281	908	138	40	178	69	11	80	139	27	166	56	191	247	1'103	593	1'696	1'696
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	56.8	31.4	49.5	34.0	25.7	31.4	60.1	20.8	54.5	22.5	14.1	20.6	65.9	38.5	44.3	49.2	31.8	43.0	1'869
activité à temps partiel	5.5	20.1	9.7	7.2	7.1	7.2	3.5	8.3	4.2	1.9	5.9	2.8	2.3	31.5	25.2	4.7	20.8	10.4	453
plusieurs activités occas.	1.4	1.5	1.4	1.3	0.0	0.9	2.8	4.2	3.0	1.3	0.7	1.1	0.0	0.6	0.5	1.2	1.1	1.2	52.0
en formation	2.6	1.6	2.3	3.3	1.4	2.7	3.5	25.0	6.6	59.2	56.3	58.6	13.2	5.7	7.5	14.6	10.3	13.1	568
sans activité prof.	19.1	30.2	22.3	24.8	34.3	27.8	12.6	20.8	13.8	5.3	8.1	5.9	14.0	19.6	18.3	16.2	24.3	19.1	830
sans travail, en quête d'emploi	8.1	7.8	8.0	18.3	18.6	18.4	11.2	8.3	10.8	5.5	6.7	5.7	1.6	3.4	3.0	7.8	6.3	7.3	317
sans travail, futur emploi garanti	0.4	0.3	0.3	1.3	1.4	1.3	0.7	0.0	0.6	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	17
autre	6.2	7.0	6.4	9.8	11.4	10.3	5.6	12.5	6.6	4.0	7.4	4.7	3.1	0.6	1.2	5.9	5.0	5.6	243
N**	1'654	668	2'322	153	70	223	143	24	167	476	135	611	129	470	600	2'802	1'546	4'349	4'349
données manquantes	906	432	1'338	172	48	220	106	26	132	242	37	279	85	328	413	1'623	932	2'555	2'555

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	27.8	37.8	30.9	46.2	63.6	51.7	19.8	58.3	24.1	15.8	23.9	17.2	10.6	25.4	22.3	25.9	35.5	29.1	626
apprenti-e, stagiaire	1.5	0.5	1.2	0.0	3.6	1.2	4.2	16.7	5.6	28.8	28.3	28.7	2.1	1.7	1.8	6.4	3.9	5.6	120
manœuvre, aide	4.5	7.8	5.5	4.3	7.3	5.2	7.3	0.0	6.5	5.9	2.2	5.2	0.0	5.8	4.5	4.6	6.5	5.3	113
ouvrier/ère formé-e sur le tas	4.8	7.6	5.6	14.5	9.1	12.8	4.2	0.0	3.7	1.4	0.0	1.1	0.0	5.8	4.5	4.8	6.9	5.5	119
ouvrier/ère formé-e (CFC)	17.5	9.6	15.1	20.5	5.5	15.7	27.1	8.3	25.0	12.6	6.5	11.6	4.3	6.4	5.9	17.0	8.7	14.2	306
contremaître-sse	4.1	0.3	2.9	2.6	0.0	1.7	3.1	0.0	2.8	0.9	0.0	0.7	4.3	1.7	2.3	3.4	0.6	2.4	52
employé-e non qualifié-e	15.0	21.1	16.9	3.4	7.3	4.7	13.5	8.3	13.0	5.4	10.9	6.3	10.6	27.2	23.6	12.1	20.1	14.8	318
empl. qualifié-e, cadre moyen	9.4	7.0	8.7	1.7	1.8	1.7	7.3	0.0	6.5	1.4	0.0	1.1	29.8	9.2	13.6	7.8	6.1	7.2	156
employé-e, cadre supérieur	4.2	2.1	3.5	0.9	0.0	0.6	4.2	8.3	4.6	0.5	0.0	0.4	8.5	2.3	3.6	3.4	1.8	2.9	62
indépendant-e	8.6	4.7	7.4	3.4	0.0	2.3	6.3	0.0	5.6	0.5	2.2	0.7	14.9	6.9	8.6	6.8	4.3	5.9	128
écolier/ère, étudiant-e	1.3	0.3	1.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	25.7	26.1	25.7	14.9	6.4	8.2	6.2	4.6	5.6	121
autre statut	1.4	1.3	1.4	1.7	1.8	1.7	3.1	0.0	2.8	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.9	1.6	1.1	1.4	31
N**	862	384	1'246	117	55	172	96	12	108	222	46	268	47	173	220	1'430	722	2'152	2'152
données manquantes	1'698	716	2'414	208	63	271	153	38	191	496	126	622	167	625	793	2'995	1'756	4'752	4'752
Revenu mensuel net*																			
aucun revenu	24.4	36.0	27.3	38.9	37.5	38.5	16.7	25.0	18.0	50.0	50.0	50.0	16.7	15.9	16.0	30.2	34.7	31.5	346
moins de 1000 fr.	3.2	4.3	3.5	11.1	8.3	10.4	7.1	12.5	8.0	25.0	25.0	25.0	25.0	13.0	14.8	8.7	9.1	8.8	97
de 1001 à 2000 fr.	4.3	9.9	5.7	13.9	12.5	13.5	11.9	12.5	12.0	10.3	13.9	11.0	0.0	11.6	9.9	6.5	11.3	7.9	87
de 2001 à 3000 fr.	12.2	17.4	13.5	5.6	25.0	10.4	9.5	0.0	8.0	0.7	5.6	1.7	0.0	7.2	6.2	8.9	13.4	10.2	112
de 3001 à 4000 fr.	12.8	13.0	12.9	9.7	0.0	7.3	19.0	12.5	18.0	6.6	0.0	5.2	0.0	18.8	16.0	11.7	11.9	11.7	129
de 4001 à 5000 fr.	16.7	6.8	14.1	15.3	12.5	14.6	19.0	37.5	22.0	4.4	2.8	4.1	8.3	10.1	9.9	14.1	7.8	12.3	135
de 5001 à 6000 fr.	12.6	8.7	11.6	2.8	4.2	3.1	7.1	0.0	6.0	1.5	2.8	1.7	25.0	13.0	14.8	9.5	7.8	9.0	99
de 6001 à 8000 fr.	10.7	1.2	8.3	2.8	0.0	2.1	4.8	0.0	4.0	1.5	0.0	1.2	16.7	7.2	8.6	7.8	2.2	6.2	68
de 8001 à 10 000 fr.	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	2.5	1.5	1.3	1.5	16
de 10 001 à 15 000 fr.	1.3	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.8	9
plus de 15 000 fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.3	0.1	1
N**	468	161	629	72	24	96	42	8	50	136	36	172	12	69	81	779	320	1'099	1'099
données manquantes	2'092	939	3'031	253	94	347	207	42	249	582	136	718	202	729	932	3'646	2'158	5'805	5'805

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Raison principale*																			
fin régulière sans transfert	52.6	52.2	52.5	26.9	23.7	26.0	39.8	38.0	39.5	60.4	63.2	61.0	69.2	69.8	69.7	52.1	57.7	54.1	3'708
fin régulière avec transfert	5.5	6.5	5.8	10.6	15.3	11.9	6.9	14.0	8.1	4.5	3.5	4.3	4.2	3.8	3.8	5.9	6.2	6.0	409
changement de domicile	2.0	1.8	2.0	8.1	7.6	8.0	3.3	4.0	3.4	2.1	2.9	2.3	0.0	1.1	0.9	2.4	2.0	2.3	156
hospitalisation	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	2.0	1.0	0.3	0.6	0.3	0.5	0.0	0.1	0.5	0.4	0.5	34
détention	0.2	0.0	0.1	1.9	0.0	1.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	13
perte de contact	26.1	24.9	25.8	38.1	37.3	37.9	37.0	30.0	35.8	23.3	24.0	23.4	16.4	16.8	16.7	26.8	22.4	25.2	1'729
rupture explicite	9.0	9.9	9.3	7.5	10.2	8.2	9.8	12.0	10.1	6.6	4.1	6.1	6.1	5.6	5.7	8.3	7.9	8.2	561
décès	2.1	1.7	1.9	2.5	4.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.3	1.4	1.0	1.3	87
autre raison	1.9	2.4	2.1	3.4	0.8	2.7	1.6	0.0	1.4	2.7	1.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.2	2.4	2.3	155
N**	2'532	1'090	3'622	320	118	438	246	50	296	713	171	884	214	798	1'013	4'384	2'467	6'852	6'852
données manquantes	28	10	38	5	0	5	3	0	3	5	1	6	0	0	0	41	11	52	52

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

Destination des transferts***																			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
traitement résidentiel	36.8	37.2	37.0	36.8	35.7	36.4	60.0	25.0	50.0	31.3	50.0	33.3	0.0	7.7	5.9	34.8	30.7	33.2	75
prise en charge ambulatoire	39.5	53.5	44.5	36.8	57.1	45.5	40.0	50.0	42.9	50.0	0.0	44.4	100.0	61.5	70.6	44.2	56.8	49.1	111
appartement protégé	1.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	2
autre institution spécialisée	22.4	9.3	17.6	26.3	7.1	18.2	0.0	25.0	7.1	12.5	50.0	16.7	0.0	30.8	23.5	19.6	12.5	16.8	38
N**	76	43	119	19	14	33	10	4	14	16	2	18	4	13	17	138	88	226	226
données manquantes	62	28	90	15	4	19	7	3	10	16	4	20	5	17	22	119	64	183	183

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

Cause de décès****																			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
suicide	13.3	7.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.3	9.8	5
accident	10.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	11.4	0.0	7.8	4
maladie	63.3	84.6	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	75.0	60.8	31
surdose ou intoxication aiguë	6.7	7.7	7.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	18.8	17.6	9
autre cause de décès	6.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	3.9	2.0
N**	30	13	43	4	2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	35	16	51	51
données manquantes	22	5	27	4	3	7	0	0	0	0	0	0	1	1	2	27	9	36	36

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	4.4	4.7	4.4	2.2	2.5	2.3	1.6	4.0	2.0	4.6	2.9	4.3	13.1	9.9	10.6	4.6	6.0	5.1	350
> 1 semaine à 1 mois	3.9	2.8	3.6	2.2	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	7.2	5.8	7.0	7.0	5.7	5.9	4.6	3.9	4.4	301
> 1 à 2 mois	4.5	5.0	4.7	1.8	0.8	1.6	2.4	4.0	2.7	6.3	7.6	6.5	5.1	5.9	5.7	4.7	5.3	4.9	339
>2 à 3 mois	4.4	4.4	4.4	2.5	1.7	2.3	3.2	0.0	2.7	6.3	4.7	6.0	4.2	7.2	6.6	4.6	5.2	4.8	332
>3 à 6 mois	12.6	12.0	12.4	10.2	8.5	9.7	10.1	8.0	9.8	13.4	13.5	13.4	19.2	16.3	16.9	12.8	13.9	13.2	909
>6 mois à 1 an	25.9	25.6	25.8	19.4	22.9	20.3	34.8	24.0	33.0	31.1	41.5	33.1	28.5	30.9	30.4	27.5	29.0	28.0	1'927
>1 à 2 ans	20.9	22.7	21.4	22.5	23.7	22.8	22.3	38.0	24.9	21.6	14.0	20.1	15.4	15.3	15.3	20.8	19.9	20.4	1'407
>2 à 3 ans	10.5	8.3	9.9	13.8	14.4	14.0	11.3	14.0	11.8	6.4	4.7	6.1	3.7	4.5	4.4	9.4	6.9	8.5	585
>3 à 5 ans	9.1	8.5	8.9	16.6	12.7	15.6	9.7	2.0	8.4	2.8	4.7	3.1	3.3	2.9	3.0	7.9	6.1	7.2	498
>5 à 10 ans	2.7	3.7	3.0	7.7	8.5	7.9	1.6	2.0	1.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	2.4	2.5	2.4	167
plus de 10 ans	1.1	2.3	1.5	1.2	1.7	1.4	0.8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.8	1.4	1.0	68
N**	2'550	1'094	3'644	325	118	443	247	50	297	718	171	889	214	796	1'011	4'413	2'469	6'883	6'883
données manquantes	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	21
Durée (en semaines)																			
moyenne	77.4	86.2	80.1	111.4	111.0	111.2	74.3	84.2	75.9	44.6	43.7	44.4	38.3	45.5	44.0	69.7	67.8	69.0	
écart-type	103.6	126.5	111.0	108.9	126.4	113.7	78.8	95.5	81.7	44.6	49.2	45.5	47.7	78.9	73.5	91.6	104.7	96.5	
1er quartile	19.7	21.1	20.0	31.7	34.9	33.3	28.9	34.7	29.1	12.6	14.0	13.0	7.9	10.1	9.9	18.3	16.1	17.7	
valeur médiane	44.6	46.4	44.9	71.1	70.9	71.1	47.1	67.9	49.9	32.4	31.1	32.1	24.9	26.3	26.0	40.9	36.0	39.0	
3e quartile	98.9	98.0	98.4	157.6	148.0	155.2	90.7	92.9	91.7	59.7	49.0	57.9	50.4	50.2	50.4	86.9	76.0	83.1	
N**	2'550	1'094	3'644	325	118	443	247	50	297	718	171	889	214	796	1'011	4'413	2'469	6'883	
données manquantes	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.8	98.1	98.6	43.3	36.3	41.4	90.6	94.6	91.2	99.3	98.7	99.2	94.5	94.0	94.4	4'153
oui	1.2	1.9	1.4	56.7	63.8	58.6	9.4	5.4	8.8	0.7	1.3	0.8	5.5	6.0	5.6	248
N**	1'912	778	2'690	217	80	297	180	37	217	592	150	742	3'168	1'233	4'401	4'401
données manquantes	648	322	970	108	38	146	69	13	82	126	22	148	1'043	447	1'490	1'490
Type de substitution***																
héroïne	0.0	7.7	3.1	1.1	2.2	1.5	7.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	2.0	4
méthadone	57.9	61.5	59.4	86.8	95.6	89.7	64.3	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0	80.9	87.7	83.2	162
autres opiacés	0.0	0.0	0.0	7.7	2.2	5.9	28.6	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	6.1	12
autres substances	42.1	30.8	37.5	4.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	7.7	8.7	17
N**	19	13	32	91	45	136	14	1	15	2	2	4	130	65	195	195
données manquantes	4	2	6	32	6	38	3	1	4	2	0	2	44	9	53	53
Substitution après la prise en charge*																
non	99.4	99.3	99.4	76.0	60.0	71.6	94.7	96.2	95.0	99.4	98.5	99.2	98.0	97.2	97.7	3'763
oui	0.6	0.7	0.6	24.0	40.0	28.4	5.3	3.8	5.0	0.6	1.5	0.8	2.0	2.8	2.3	87
N**	1'754	707	2'461	146	55	201	133	26	159	484	134	618	2'760	1'090	3'850	3'850
données manquantes	806	393	1'199	179	63	242	116	24	140	234	38	272	1'451	590	2'041	2'041
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	0.0	20.0	6.7	2.9	9.1	5.3	14.3	0.0	12.5	66.7	0.0	40.0	7.1	9.7	8.0	7
traitement de substitution	100.0	80.0	93.3	97.1	90.9	94.7	85.7	100.0	87.5	33.3	100.0	60.0	92.9	90.3	92.0	80
N**	10	5	15	35	22	57	7	1	8	3	2	5	56	31	87	87
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Postcure prévue et mise en place*																
non	88.4	84.3	87.3	79.1	80.4	79.5	89.0	66.7	85.3	87.1	94.4	88.5	87.5	84.2	86.7	1'922
oui	11.6	15.7	12.7	20.9	19.6	20.5	11.0	33.3	14.7	12.9	5.6	11.5	12.5	15.8	13.3	296
N**	1'068	394	1'462	139	46	185	91	18	109	241	54	295	1'653	565	2'218	2'218
<i>données manquantes</i>	1'492	706	2'198	186	72	258	158	32	190	477	118	595	2'558	1'115	3'673	3'673
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
service de postcure de l'institution	1.7	3.4	2.2	0.0	16.7	3.2	25.0	0.0	14.3	3.4	0.0	3.2	2.6	4.9	3.3	9
appartement protégé extérieur	3.4	1.7	2.8	0.0	16.7	3.2	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	3.6	2.4	3.3	9
service de postcure extérieur	8.4	13.6	10.1	16.0	0.0	12.9	0.0	16.7	7.1	3.4	0.0	3.2	8.2	11.0	9.1	25
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	24.4	27.1	25.3	8.0	0.0	6.5	12.5	0.0	7.1	10.3	0.0	9.7	18.6	20.7	19.2	53
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	7.6	5.1	6.7	20.0	50.0	25.8	25.0	33.3	28.6	13.8	0.0	12.9	10.3	12.2	10.9	30
autre centre de consultation	21.8	11.9	18.5	20.0	16.7	19.4	12.5	16.7	14.3	24.1	50.0	25.8	21.6	14.6	19.6	54
groupe d'entraide	4.2	15.3	7.9	4.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	6.5	4.1	11.0	6.2	17
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1
autre	32.8	28.8	31.5	36.0	0.0	29.0	25.0	33.3	28.6	37.9	50.0	38.7	36.1	29.3	34.1	94
N**	119	59	178	25	6	31	8	6	14	29	2	31	194	82	276	276
<i>données manquantes</i>	5	3	8	4	3	7	2	0	2	2	1	3	13	7	20	20

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Problèmes addictifs*																
alcool	48.5	55.5	50.5	20.1	15.5	18.8	19.5	26.1	20.6	11.6	10.9	11.5	35.2	38.4	36.2	1'253
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.1	0.0	0.1	1.5	5.2	2.6	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	9
héroïne	0.4	0.9	0.5	36.6	50.0	40.6	3.4	4.3	3.5	0.9	0.8	0.9	2.6	3.7	2.9	102
méthadone	0.5	0.6	0.5	17.9	22.4	19.3	0.8	4.3	1.4	0.5	0.0	0.4	1.5	1.9	1.6	55
autres opiacés	0.1	0.5	0.2	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	7
cocaïne	1.2	0.9	1.1	6.7	10.3	7.8	46.6	56.5	48.2	0.9	3.4	1.4	3.6	3.0	3.4	118
crack, freebase	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	3
amphétamines	0.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.5	0.8	4.3	1.4	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	22
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	3.4	4.3	3.5	0.2	0.8	0.4	0.5	0.3	0.5	16
autres stimulants	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
barbituriques	0.0	0.2	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	4
benzodizépines	0.7	2.7	1.3	11.2	10.3	10.9	5.1	4.3	5.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.0	2.0	69
autres somnifères et tranquillisants	0.3	0.3	0.3	1.5	0.0	1.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	5
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	3.7	1.7	3.1	9.0	15.5	10.9	11.9	13.0	12.1	56.0	57.1	56.3	13.9	9.5	12.6	436
tabac	11.5	10.9	11.3	15.7	20.7	17.2	12.7	26.1	14.9	15.0	17.6	15.6	13.9	16.0	14.5	503
autres substances	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	0.2	2.5	0.7	0.7	0.7	0.7	25
jeu pathologique	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	29
troubles alimentaires	0.0	1.3	0.4	0.0	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1	5.5	1.7	58
autres troubles assimilable à une addiction	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.2	0.9	1.1	38
aucun	46.1	39.1	44.1	38.1	27.6	34.9	38.1	21.7	35.5	35.5	32.8	34.9	42.7	35.5	40.6	1'406
N**	1'552	632	2'184	134	58	192	118	23	141	439	119	558	2'460	1'004	3'464	3'464
<i>données manquantes</i>	<i>1'008</i>	<i>468</i>	<i>1'476</i>	<i>191</i>	<i>60</i>	<i>251</i>	<i>131</i>	<i>27</i>	<i>158</i>	<i>279</i>	<i>53</i>	<i>332</i>	<i>1'751</i>	<i>676</i>	<i>2'427</i>	<i>2'427</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes, substance ou comportement impliqué et durée des rechutes pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	66.1	47.7	60.8	41.8	42.9	42.1	61.7	44.4	59.4	73.9	54.5	70.3	65.2	47.9	60.5	861
une fois	9.1	13.2	10.3	19.4	0.0	13.7	10.0	11.1	10.1	7.0	24.2	10.3	9.4	13.7	10.5	150
deux fois	4.9	8.4	5.9	7.5	3.6	6.3	3.3	0.0	2.9	4.9	3.0	4.6	5.1	7.7	5.8	83
trois ou quatre fois	8.3	14.3	10.0	11.9	14.3	12.6	8.3	11.1	8.7	5.6	15.2	7.4	7.9	13.7	9.5	135
cinq fois ou plus	11.5	16.4	12.9	19.4	39.3	25.3	16.7	33.3	18.8	8.5	3.0	7.4	12.5	17.0	13.7	195
N**	711	287	998	67	28	95	60	9	69	142	33	175	1'036	388	1'424	1'424
<i>données manquantes</i>	1'849	813	2'662	258	90	348	189	41	230	576	139	715	3'175	1'292	4'467	4'467
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	94.6	97.9	95.9	25.0	40.0	29.4	38.1	33.3	37.5	8.3	0.0	6.5	70.1	79.8	73.5	378
cocktails (héroïne et cocaïne)	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	3
opiacés	3.6	1.4	2.8	75.0	86.7	78.4	19.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.0	9.3	11.7	60
cocaïne et dérivés	3.2	1.4	2.5	22.2	33.3	25.5	85.7	66.7	83.3	11.1	10.0	10.9	11.5	6.0	9.5	49
stimulants	1.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.2	5.6	0.0	4.3	2.7	0.0	1.8	9
médicaments	2.3	3.5	2.8	30.6	33.3	31.4	23.8	0.0	20.8	2.8	0.0	2.2	7.9	6.0	7.2	37
hallucinogènes	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	0.3	0.5	0.4	2
cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
tabac	5.4	0.7	3.6	11.1	20.0	13.7	33.3	33.3	33.3	88.9	100.0	91.3	17.5	8.7	14.4	74
substances volatiles	2.7	1.4	2.2	5.6	6.7	5.9	4.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	2.9	15
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	2
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	1.4	7
troubles alimentaires	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	5
autres troubles assimilables à une addiction	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	4
N**	221	141	362	36	15	51	21	3	24	36	10	46	331	183	514	514
<i>données manquantes</i>	20	9	29	3	1	4	2	2	4	1	5	6	30	19	49	49
Durée des rechutes****																
1 à 2 jours	24.5	46.0	33.1	9.1	20.0	12.5	50.0	0.0	50.0	50.0	75.0	54.5	29.3	48.8	36.4	80
3 à 6 jours	37.2	31.7	35.0	36.4	20.0	31.3	25.0	0.0	25.0	27.8	25.0	27.3	35.0	27.5	32.3	71
7 à 10 jours	13.8	6.3	10.8	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	5.0	8.6	19
>10 jours à 2 semaines	8.5	1.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	6.4	1.3	4.5	10
>2 à 4 semaines	7.4	6.3	7.0	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	7.1	6.3	6.8	15
>4 à 6 semaines	3.2	1.6	2.5	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	3.2	7
>6 à 8 semaines	0.0	1.6	0.6	0.0	20.0	6.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	1.4	3
>2 mois	5.3	4.8	5.1	9.1	0.0	6.3	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	7.1	6.3	6.8	15
N**	94	63	157	11	5	16	12	0	12	18	4	22	140	80	220	220
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Pourcentages par colonne, une seule catégorie possible

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	29.0	40.9	32.4	6.3	3.7	5.5	11.1	0.0	9.2	12.9	11.4	12.6	24.3	34.0	26.9	337
1 jour par semaine ou moins	0.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.6	0.3	0.5	6
2 à 3 jours par semaine	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	2.4	0.0	1.9	0.9	0.3	0.7	9
4 à 6 jours par semaine	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	3.8	1.1	0.6	1.0	12
une fois par jour	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	3.1	1.0	0.3	0.8	10
plusieurs fois par jour	67.9	58.7	65.3	93.8	96.3	94.5	88.9	90.9	89.2	77.4	80.0	78.0	72.2	64.5	70.1	877
N**	611	242	853	64	27	91	54	11	65	124	35	159	907	344	1'251	1'251
<i>données manquantes</i>	<i>1'949</i>	<i>858</i>	<i>2'807</i>	<i>261</i>	<i>91</i>	<i>352</i>	<i>195</i>	<i>39</i>	<i>234</i>	<i>594</i>	<i>137</i>	<i>731</i>	<i>3'304</i>	<i>1'336</i>	<i>4'640</i>	<i>4'640</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	20.7	24.0	21.6	6.7	13.6	9.6	28.9	33.3	29.5	52.8	47.1	51.7	26.6	26.6	26.6	156
11 à 20 cigarettes par jour	47.3	44.8	46.6	40.0	59.1	48.1	44.7	33.3	43.2	34.7	35.3	34.8	44.3	46.1	44.8	263
21 à 30 cigarettes par jour	22.5	28.1	24.0	40.0	27.3	34.6	18.4	33.3	20.5	12.5	11.8	12.4	21.5	24.0	22.1	130
31 cigarettes par jour ou plus	9.5	3.1	7.8	13.3	0.0	7.7	7.9	0.0	6.8	0.0	5.9	1.1	7.6	3.2	6.5	38
N**	275	96	371	30	22	52	38	6	44	72	17	89	433	154	587	587
<i>données manquantes</i>	<i>159</i>	<i>47</i>	<i>206</i>	<i>30</i>	<i>4</i>	<i>34</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>36</i>	<i>14</i>	<i>50</i>	<i>254</i>	<i>73</i>	<i>327</i>	<i>327</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2012)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	34.2	41.3	36.2	80.0	67.6	76.7	74.7	80.0	75.5	47.3	37.2	45.6	42.4	44.5	42.9	801
abstinence limitée dans le temps	17.8	11.5	16.0	4.2	2.9	3.9	8.9	6.7	8.5	8.2	7.0	8.0	14.4	9.8	13.2	246
consommation contrôlée	34.5	37.2	35.3	5.3	14.7	7.8	8.9	0.0	7.4	24.6	39.5	27.2	29.4	33.2	30.4	567
aucune limitation envisagée	2.6	1.4	2.3	2.1	0.0	1.6	1.3	6.7	2.1	9.7	2.3	8.4	3.5	1.8	3.1	57
pas déterminé pour l'instant	8.9	8.0	8.7	6.3	14.7	8.5	6.3	6.7	6.4	10.1	14.0	10.8	8.9	9.2	8.9	167
autre	1.9	0.6	1.5	2.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	28
N**	906	349	1'255	95	34	129	79	15	94	207	43	250	1'378	488	1'866	1'866
<i>données manquantes</i>	1'654	751	2'405	230	84	314	170	35	205	511	129	640	2'833	1'192	4'025	4'025
Pronostic*																
très bon pronostic	18.8	14.4	17.6	10.7	2.9	8.7	26.0	25.0	25.8	25.1	21.7	24.5	18.9	15.0	17.9	341
bon pronostic	47.7	48.8	48.0	46.6	54.3	48.6	41.6	16.7	38.2	48.2	56.5	49.8	47.4	50.1	48.1	915
plutôt mauvais pronostic	23.6	22.2	23.2	32.0	20.0	29.0	22.1	41.7	24.7	18.8	19.6	19.0	24.0	21.8	23.4	446
mauvais pronostic	9.9	14.7	11.2	10.7	22.9	13.8	10.4	16.7	11.2	7.9	2.2	6.8	9.7	13.0	10.6	201
N**	937	361	1'298	103	35	138	77	12	89	191	46	237	1'404	499	1'903	1'903
<i>données manquantes</i>	1'623	739	2'362	222	83	305	172	38	210	527	126	653	2'807	1'181	3'988	3'988

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2012)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Sexe*																
hommes			63.2			68.4			81.8			77.0			73.0	498
femmes			36.8			31.6			18.2			23.0			27.0	184
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	36	21	57	147	68	215	99	22	121	47	14	61	498	184	682	682
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
15-19	2.8	9.5	5.3	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	2.5	34.0	21.4	31.1	4.8	4.4	4.7	32
20-24	11.1	4.8	8.8	4.8	14.9	7.9	8.1	13.6	9.1	29.8	21.4	27.9	10.6	14.2	11.6	79
25-29	5.6	9.5	7.0	17.7	9.0	15.0	15.2	0.0	12.4	14.9	14.3	14.8	13.7	13.7	13.7	93
30-34	16.7	4.8	12.3	15.0	16.4	15.4	18.2	27.3	19.8	12.8	21.4	14.8	16.7	16.9	16.7	114
35-39	8.3	9.5	8.8	17.0	14.9	16.4	21.2	22.7	21.5	8.5	7.1	8.2	19.1	15.3	18.1	123
40-44	27.8	9.5	21.1	15.6	11.9	14.5	21.2	13.6	19.8	0.0	0.0	0.0	16.3	9.3	14.4	98
45-49	13.9	9.5	12.3	11.6	6.0	9.8	9.1	13.6	9.9	0.0	0.0	0.0	9.6	8.7	9.4	64
50-54	5.6	28.6	14.0	12.2	13.4	12.6	3.0	4.5	3.3	0.0	7.1	1.6	6.2	9.8	7.2	49
55-59	5.6	9.5	7.0	3.4	6.0	4.2	1.0	0.0	0.8	0.0	7.1	1.6	1.8	4.4	2.5	17
60-64	2.8	0.0	1.8	2.0	3.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	6
65-69	0.0	4.8	1.8	0.7	3.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	4
70-74	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	2
75 et plus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	36	21	57	147	67	214	99	22	121	47	14	61	498	183	681	681
données manquantes	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Age (valeurs centrales)																
moyenne	39.0	42.4	40.3	38.9	39.9	39.2	36.4	35.5	36.2	23.3	29.2	24.7	35.7	36.6	35.9	
écart-type	10.8	14.1	12.1	10.3	12.8	11.1	8.8	9.9	9.0	6.9	11.7	8.5	10.1	12.1	10.7	
1er quartile	31.5	34.0	33.0	31.0	30.0	30.0	29.2	31.0	30.0	18.0	20.0	18.0	28.7	27.0	28.0	
valeur médiane	40.5	48.0	41.0	38.4	37.0	38.0	36.4	37.0	36.9	21.0	26.5	22.0	35.2	35.0	35.0	
3e quartile	47.0	52.1	49.0	46.3	50.0	47.0	42.89	42.0	42.9	28.0	33.0	30.0	42.0	46.0	43.0	
N**	36	21	57	147	67	214	99	22	121	47	14	61	498	183	681	
données manquantes	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

A2 Données de base d'institutions non participantes: Problème principal à l'admission (patient-e-s) (2012)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	
Problème principal*				
alcool	7.2	11.4	8.4	57
opiacés	29.5	37.0	31.5	215
cocaïne	19.9	12.0	17.7	121
stimulants	7.0	2.7	5.9	40
hypnotiques/sedatives	1.6	2.2	1.8	12
hallucinogènes	0.4	2.2	0.9	6
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	9.4	7.6	8.9	61
tabac	3.2	1.6	2.8	19
autre substance	1.0	1.6	1.2	8
consommation multiple**	20.7	21.7	21.0	143
non lié à une substance	0.0	0.0	0.0	0
N***	498	184	682	682
<i>données manquantes</i>	0	0	0	0

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu