

Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance

Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2013

Recueil de tableaux statistiques

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du monitoring act-info. Nous remercions également les collaborateurs et collaboratrices des services de consultation qui ont effectué les tâches de logistique et de saisie. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info. Un grand merci également à Edith Bacher et Christiane Gmel pour la conception graphique et la mise en page de ce rapport ainsi qu'à Marina Delgrande Jordan pour sa précieuse collaboration dans le développement des syntaxes d'analyse.

Compléments d'information: Etienne Maffli, tél. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Réalisation: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Addiction Suisse

Diffusion: Recherche, Addiction Suisse, case postale 870,
1001 Lausanne, tél. 021/321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prix: Fr. 10.–

Langue du texte original: allemand

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2014

Citation recommandée: Astudillo, M., Notari, L. & Maffli, E. (2014). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance: résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2013 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)	7

ADMISSION

T1	Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T2	État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T3	Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T4	Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T5	Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T6	Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T7	Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T8	Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
T9	Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T10	Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T11	Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2013)
T12	Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
T13	Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2013)
T14	Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2013)
T15.1a	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes
T15.1b	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), femmes
T15.1c	Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes

- T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes
- T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), femmes
- T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes et femmes
- T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013), hommes
- T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013), femmes
- T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013), hommes et femmes
- T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), hommes
- T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), femmes
- T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), hommes et femmes
- T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2013)
- T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), hommes
- T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), femmes
- T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), hommes et femmes
- T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), hommes
- T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), femmes
- T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), hommes et femmes

- T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), hommes
- T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), femmes
- T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), hommes et femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), hommes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), femmes
- T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), hommes et femmes
- T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2013)
- T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2013)

SORTIE

- T27 Sexe et âge, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T32b Destination des transferts, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T32c Cause de décès, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal et chez les proches (2013)
- T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

- T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)
- T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème (seulement patient-e-s) (2013)

Annexe

Données de base d'institutions ne participant pas au monitoring *act-info*

- A1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2013)
- A2 Problème principal à l'admission (2013)

act-info - addiction care and therapy information

Le Réseau de monitoring (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse:

- SAMBAD (Statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance)
- Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- Méthadone (Statistique nationale des traitements de substitution)

Ces cinq statistiques disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés. Les données communes sont intégrées dans une base de données centralisée, permettant ainsi de procéder à des analyses sur l'ensemble des secteurs. Avec l'adoption des standards européens (Treatment Demand Indicator), la comparabilité des données au plan international est également garantie.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Info Suisse à Lausanne et à l'Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé à Zürich (ISGF).

act-info dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD)

Dès 2004, les instruments de monitoring act-info ont été introduits dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance et ont remplacé les anciens questionnaires en vigueur depuis 1994. Après plusieurs années d'utilisation, une révision de ces instruments a eu lieu et les nouveaux questionnaires ont été introduits le 1^{er} janvier 2013. Ce processus a été harmonisé avec la révision des normes européennes. De façon à répondre aux différents besoins, une version raccourcie est également disponible dans le domaine ambulatoire. Le monitoring dans ce secteur est confié à Addiction Suisse à Lausanne.

La statistique act-info SAMBAD offre un aperçu de la clientèle de l'aide ambulatoire en matière de dépendance en Suisse. Les données sont récoltées au début et à la fin de la prise en charge. Les informations rassemblées à l'admission renseignent en particulier sur les caractéristiques sociodémographiques des client-e-s, sur leurs expériences de traitement ainsi que sur leurs modes de consommation et problèmes psychosociaux avant la prise en charge. Les informations récoltées à la sortie rendent principalement compte des circonstances de la fin de la prise en charge et des caractéristiques sociodémographiques des client-e-s à ce moment.

En 2013, 72 des 193 institutions recensées dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance ont participé au monitoring act-info. Il s'agit de services de consultation spécialisés pour les problèmes liés à l'alcool et/ou aux drogues illégales ainsi que de divers types de services polyvalents offrant également une aide pour les problèmes addictifs.

Explications concernant les tableaux

La présente statistique descriptive des données de l'enquête act-*info* auprès des client-e-s du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance repose sur deux types de tableaux:

- lorsque la question a des catégories de réponses prédéfinies ou recodées en tranches distinctes (par exemple "état civil" ou "âge"), le tableau indique les pourcentages des différentes catégories de réponses
- lorsque la question n'a pas de catégories prédéfinies, mais requiert une valeur numérique (par exemple "âge au début de la consommation problématique"), le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1er quartile, 3e quartile)

La plupart des tableaux présentent les résultats de façon distincte pour les sous-groupes de patients et patientes ayant mentionné l'alcool, un opiacé (héroïne notamment), la cocaïne (et dérivés) ou le cannabis comme problème principal au moment de leur admission. Les proches venant consulter pour les problèmes d'un tiers font également l'objet d'analyses séparées pour les aspects socio-démographiques. A l'exception des thèmes directement liés aux modes de consommation ou aux formes de comportements addictifs non liés aux substances, les résultats ne sont en revanche pas présentés séparément pour les client-e-s (peu nombreux) ayant mentionné d'autres substances (par exemple un stimulant ou les substances volatiles) ou un problème addictif non lié à une substance (par exemple jeu pathologique) comme problème principal. Ces personnes sont cependant incluses dans les analyses portant sur l'ensemble des prises en charge figurant dans les blocs à droite des tableaux respectifs. Toutes les analyses sont effectuées séparément pour les hommes et pour les femmes ainsi que pour les deux sexes confondus (colonnes "Total" comprenant le cas échéant également les quelques personnes dont le sexe n'est pas connu).

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Le nombre de réponses valides N représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages ou autres paramètres. Il est indiqué pour chaque groupe ou sous-groupe considéré. Au dessous, le nombre correspondant de données manquantes figure également. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés particulièrement prudemment.

Des notes en bas de tableau renseignent sur les éventuelles particularités des groupes de référence ainsi que sur le type de question. Lorsque plusieurs réponses sont possibles (par exemple aux tableaux du thème T19, "autres problèmes addictifs") les pourcentages obtenus ne sont pas additifs.

Les institutions ne participant pas au monitoring act-*info* ont été invitées à fournir des données de base (âge, sexe et problème principal à l'admission). Quatorze institutions ont répondu à cette demande. Les données de ces 14 institutions ont été analysées séparément et les résultats sont présentés en annexe.

T1 Sexe et âge à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sexe*																			
hommes	70.2			75.8			83.5			82.3			20.2			64.7 4'342			
femmes	29.8			24.2			16.5			17.7			79.8			35.3 2'374			
sexe pas connu	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0 0			
N**	2'306	979	3'285	292	93	385	203	40	243	905	194	1'099	200	788	988	4'342	2'374	6'716	6'716
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.5	5.5	1.0	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	108
15-19	2.2	2.1	2.2	0.3	2.2	0.8	5.4	17.9	7.5	60.8	56.8	60.1	5.7	1.9	2.7	16.4	8.6	13.7	908
20-24	4.3	2.8	3.9	6.2	11.8	7.5	12.4	30.8	15.4	11.0	13.7	11.5	4.2	4.0	4.0	7.0	5.9	6.6	437
25-29	7.3	5.4	6.7	14.4	22.6	16.4	20.8	25.6	21.6	9.5	7.9	9.2	4.7	6.5	6.1	9.0	7.4	8.5	562
30-34	11.3	7.6	10.2	20.2	15.1	19.0	20.8	7.7	18.7	7.2	5.8	7.0	8.3	9.9	9.6	11.3	8.7	10.4	692
35-39	10.5	9.8	10.3	16.4	7.5	14.3	16.3	10.3	15.4	2.7	2.6	2.7	5.2	7.3	6.9	9.4	8.4	9.1	602
40-44	13.7	12.8	13.4	22.9	19.4	22.1	13.9	5.1	12.4	2.0	1.1	1.8	9.9	13.4	12.7	11.1	11.8	11.3	754
45-49	15.3	18.3	16.2	11.6	17.2	13.0	6.9	2.6	6.2	0.9	1.1	0.9	14.6	17.4	16.8	10.9	15.0	12.4	822
50-54	12.8	15.8	13.7	6.2	2.2	5.2	1.5	0.0	1.2	0.9	0.5	0.8	13.5	14.0	13.9	8.7	12.3	9.9	661
55-59	10.1	11.9	10.7	1.7	1.1	1.6	2.0	0.0	1.7	0.3	0.5	0.4	12.5	9.9	10.4	6.6	8.9	7.4	492
60-64	6.3	6.6	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.0	5.4	4.5	297
65-69	4.0	4.1	4.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.3	3.8	4.5	2.6	3.3	2.8	186
70-74	1.8	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.3	2.6	1.1	1.8	1.4	90
75 et plus	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.1	2.4	0.3	1.1	0.6	38
N**	2'301	973	3'274	292	93	385	202	39	241	899	190	1'089	192	771	963	4'312	2'337	6'649	6'649
données manquantes	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	67
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	44.8	46.8	45.4	37.7	35.7	37.2	33.6	27.0	32.5	21.3	21.0	21.3	47.5	45.8	46.1	37.8	42.4	39.4	
écart-type	12.8	12.3	12.7	8.5	10.2	9.0	8.8	7.6	8.9	7.8	8.2	7.9	16.0	14.0	14.4	15.2	15.0	15.3	
1er quartile	35.0	38.6	36.1	31.2	26.5	30.1	28.1	22.2	25.9	16.6	16.4	16.5	36.2	35.7	35.8	25.0	30.7	27.2	
valeur médiane	45.2	47.4	45.9	37.9	34.1	37.3	32.2	25.2	31.6	17.8	17.5	17.7	48.8	47.0	47.3	37.5	44.1	40.1	
3e quartile	53.7	55.2	54.3	43.9	44.0	44.0	39.67	31.5	39.0	24.2	22.7	24.0	58.2	54.5	55.5	49.1	53.2	50.7	
N**	2'301	973	3'274	292	93	385	202	39	241	899	190	1'089	192	771	963	4'312	2'337	6'649	
données manquantes	5	6	11	0	0	0	1	1	2	6	4	10	8	17	25	30	37	67	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T2 État civil et nationalité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
État civil*																			
célibataire	40.9	33.3	38.6	66.2	70.4	67.1	63.5	75.7	65.5	94.0	89.7	93.2	28.1	24.3	25.1	56.5	40.0	50.8	3'194
marié-e	33.1	30.1	32.2	20.3	9.9	18.0	19.8	13.5	18.8	3.5	3.3	3.4	58.9	53.6	54.6	25.6	33.5	28.3	1'783
séparé-e	4.6	5.1	4.8	2.8	2.5	2.8	3.1	0.0	2.6	0.6	1.6	0.8	2.2	2.9	2.7	3.2	3.8	3.4	215
divorcé-e	19.3	26.8	21.5	8.9	12.3	9.7	12.5	10.8	12.2	1.6	3.8	2.0	8.1	16.8	15.0	13.0	19.2	15.2	958
veuf/veuve	1.5	4.3	2.3	0.7	1.2	0.8	0.5	0.0	0.4	0.1	0.5	0.2	0.5	2.3	2.0	1.0	3.0	1.7	105
partenariat enregistré	0.6	0.4	0.6	1.1	3.7	1.7	0.5	0.0	0.4	0.2	1.1	0.4	2.2	0.1	0.5	0.7	0.5	0.6	38
N**	2'193	917	3'110	281	81	362	192	37	229	832	184	1'016	185	732	917	4'085	2'208	6'293	6'293
données manquantes	113	62	175	11	12	23	11	3	14	73	10	83	15	56	71	257	166	423	423
Nationalité*																			
CH	79.2	85.7	81.1	64.1	83.6	69.0	66.5	73.5	67.6	81.5	90.2	83.1	82.8	85.2	84.7	78.3	85.7	81.0	4'735
EU	15.2	10.9	13.9	28.6	13.7	24.8	22.0	17.6	21.3	12.3	7.9	11.5	13.8	11.5	11.9	15.3	10.9	13.7	803
autre	5.6	3.4	4.9	7.4	2.7	6.2	11.6	8.8	11.1	6.2	1.8	5.4	3.4	3.3	3.3	6.4	3.4	5.3	310
N**	2'020	855	2'875	217	73	290	173	34	207	780	164	944	174	723	897	3'743	2'105	5'848	5'848
données manquantes	286	124	410	75	20	95	30	6	36	125	30	155	26	65	91	599	269	868	868

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T3 Degré d'urbanisation du domicile, type de ménage et situation de domicile à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	8.3	8.2	8.3	3.2	2.2	2.9	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.4	12.8	10.2	10.7	5.5	6.9	6.0	391
périphérie des grands centres	15.8	15.5	15.7	10.6	15.4	11.8	18.0	13.2	17.2	10.3	8.4	10.0	20.3	14.3	15.5	13.9	13.2	13.7	890
villes de moyenne importance	14.2	17.1	15.0	12.0	12.1	12.0	16.0	10.5	15.1	26.0	23.7	25.6	14.4	14.7	14.7	17.0	17.8	17.3	1'127
petites villes	33.5	32.5	33.2	43.5	47.3	44.4	44.0	50.0	45.0	32.3	33.7	32.5	25.7	33.2	31.7	35.1	34.5	34.9	2'274
campagne	28.1	26.8	27.7	30.7	23.1	28.9	21.5	26.3	22.3	31.0	33.7	31.5	26.7	27.6	27.4	28.4	27.6	28.1	1'831
N**	2'241	944	3'185	283	91	374	200	38	238	883	190	1'073	187	747	934	4'226	2'287	6'513	6'513
données manquantes	65	35	100	9	2	11	3	2	5	22	4	26	13	41	54	116	87	203	203
Type de ménage (30 derniers jours)*																			
seul-e en ménage	35.9	35.2	35.6	35.2	23.7	32.5	28.9	30.6	29.2	12.5	10.3	12.1	23.0	13.2	15.0	28.5	27.2	28.1	1'494
avec famille d'origine	7.8	4.4	6.8	13.6	9.2	12.6	17.3	19.4	17.7	67.5	59.2	66.0	14.9	5.2	7.0	24.5	13.1	20.8	1'109
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	45.9	51.7	47.6	28.0	46.1	32.2	36.4	33.3	35.9	7.9	13.8	9.0	60.8	79.7	76.2	34.8	50.5	39.9	2'122
avec des amis ou d'autres personnes	2.7	2.2	2.5	5.6	2.6	4.9	6.9	8.3	7.2	3.8	2.9	3.7	1.4	1.5	1.5	3.4	2.6	3.2	169
en prison	0.4	0.1	0.3	2.4	1.3	2.1	1.7	0.0	1.4	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	22
institution/foyer	1.4	1.4	1.4	3.2	3.9	3.4	2.3	0.0	1.9	2.7	4.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	90
hôpital/clinique	2.5	1.9	2.3	1.2	5.3	2.1	3.5	2.8	3.3	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	1.7	93
autre	3.5	3.1	3.4	10.8	7.9	10.1	2.9	5.6	3.3	4.6	9.8	5.5	0.0	0.3	0.3	4.3	3.8	4.2	221
N**	1'952	859	2'811	250	76	326	173	36	209	782	174	956	74	325	399	3'600	1'720	5'320	5'320
données manquantes	354	120	474	42	17	59	30	4	34	123	20	143	126	463	589	742	654	1'396	1'396
Situation de domicile (30 dernier jours)*																			
logement stable	90.9	92.9	91.5	82.3	80.3	81.9	86.1	84.4	85.8	90.3	85.5	89.4	96.4	97.1	97.0	90.3	93.0	91.2	4'577
logement instable/SDF	3.4	3.5	3.4	10.6	4.9	9.3	7.9	9.4	8.2	5.4	7.2	5.8	3.6	2.6	2.8	4.5	3.6	4.2	210
en prison	0.4	0.1	0.3	2.5	1.6	2.3	2.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	22
institution/foyer/hôpital/autre	5.3	3.4	4.7	4.5	13.1	6.6	4.0	6.3	4.4	4.0	7.2	4.6	0.0	0.3	0.2	4.6	3.3	4.2	210
N**	1'893	817	2'710	198	61	259	151	32	183	698	152	850	83	350	433	3'363	1'656	5'019	5'019
données manquantes	413	162	575	94	32	126	52	8	60	207	42	249	117	438	555	979	718	1697	1'697

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T4 Type de relation de couple, nombre d'enfants propres et d'enfants vivant dans le ménage à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

Type de relation de couple*	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
sans partenaire, seul-e	35.4	36.5	35.7	43.5	38.5	42.1	40.2	37.5	39.8	69.1	55.8	66.2	20.0	15.9	16.6	42.8	34.6	39.9	1'191
relations temporaires	4.0	3.9	4.0	8.7	7.7	8.4	2.4	25.0	6.1	5.3	4.8	5.2	4.0	2.6	2.9	4.6	4.4	4.6	136
partenaire fixe, vivant séparé	11.8	13.6	12.3	14.5	7.7	12.6	26.8	18.8	25.5	17.6	26.0	19.4	20.0	10.1	11.9	14.0	14.7	14.3	426
partenaire fixe, ménage commun	48.8	46.0	48.0	33.3	46.2	36.8	30.5	18.8	28.6	8.0	13.5	9.2	56.0	71.4	68.6	38.6	46.2	41.3	1'233
N**	1'171	515	1'686	69	26	95	82	16	98	375	104	479	50	227	277	1'928	1'058	2'986	2'986
données manquantes	1'135	464	1'599	223	67	290	121	24	145	530	90	620	150	561	711	2'414	1'316	3'730	3'730
Nombre d'enfants propres*																			
aucun	53.6	47.1	51.7	70.0	64.8	68.7	71.0	75.8	71.8	92.9	90.2	92.4	47.7	26.5	30.6	66.7	51.0	61.6	2'997
1 enfant	13.5	19.3	15.3	16.7	21.1	17.8	14.2	9.1	13.3	3.7	3.7	3.7	15.1	17.7	17.2	11.0	16.4	12.7	619
2 enfants	23.3	23.6	23.4	11.4	12.7	11.7	11.1	15.2	11.8	3.3	4.3	3.4	23.3	33.8	31.7	16.0	22.0	18.0	875
3 enfants ou plus	9.6	9.9	9.7	1.9	1.4	1.8	3.7	0.0	3.1	0.1	1.8	0.4	14.0	22.0	20.4	6.3	10.6	7.7	374
N**	1'765	745	2'510	210	71	281	162	33	195	736	163	899	86	355	441	3'281	1'584	4'865	4'865
données manquantes	541	234	775	82	22	104	41	7	48	169	31	200	114	433	547	1'061	790	1'851	1'851
Nombre d'enfants dans le ménage*																			
aucun	80.6	77.1	79.6	90.0	90.6	90.2	86.3	87.5	86.5	82.4	77.7	81.6	61.0	48.5	50.9	81.4	72.1	78.4	3'841
1 enfant	7.9	12.2	9.2	4.0	7.8	4.9	5.0	6.3	5.2	5.6	6.6	5.8	17.1	22.7	21.6	7.3	13.3	9.2	452
2 enfants	8.9	7.7	8.6	5.5	0.0	4.2	6.8	6.3	6.7	9.3	13.3	10.0	15.9	20.9	20.0	8.8	11.0	9.5	466
3 enfants ou plus	2.6	3.0	2.7	0.5	1.6	0.8	1.9	0.0	1.6	2.7	2.4	2.6	6.1	7.8	7.5	2.5	3.7	2.9	141
N**	1'792	757	2'549	200	64	264	161	32	193	745	166	911	82	344	426	3'311	1'589	4'900	4'900
données manquantes	514	222	736	92	29	121	42	8	50	160	28	188	118	444	562	1'031	785	1'816	1'816

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T5 Plus haute formation achevée et statut professionnel à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Plus haute formation achevée*																			
aucune formation achevée	3.1	4.7	3.6	4.7	5.3	4.8	6.1	10.3	6.8	18.5	25.8	19.9	3.6	3.2	3.3	8.0	7.2	7.7	349
école obligatoire	10.7	13.2	11.4	27.6	26.3	27.3	21.1	34.5	23.3	56.9	43.9	54.5	13.4	10.4	11.0	24.2	18.3	22.2	1'007
formation de transition	3.1	3.8	3.3	3.5	3.5	3.5	1.4	0.0	1.1	2.5	4.5	2.9	2.7	1.8	2.0	2.8	3.3	3.0	134
formation générale sans maturité	9.0	5.7	8.0	14.1	10.5	13.2	4.8	6.9	5.1	2.4	1.3	2.2	6.3	9.5	8.8	7.3	6.0	6.9	311
formation prof. de base et apprentissage	51.3	52.5	51.7	41.8	49.1	43.6	55.8	37.9	52.8	15.8	16.8	16.0	38.4	47.6	45.7	40.9	45.0	42.3	1'916
maturité ou école normale	4.3	6.6	4.9	0.6	3.5	1.3	2.7	0.0	2.3	1.9	3.2	2.2	9.8	8.5	8.8	3.7	6.9	4.8	216
formation prof. supérieure	9.7	7.0	8.9	5.3	1.8	4.4	6.1	6.9	6.3	0.7	0.6	0.7	15.2	7.6	9.2	6.9	5.7	6.5	294
haute école spécialisée et université	8.0	5.5	7.3	1.2	0.0	0.9	1.4	3.4	1.7	1.2	2.6	1.5	8.0	9.9	9.5	5.5	6.8	5.9	268
doctorat ou habilitation	0.8	0.9	0.8	1.2	0.0	0.9	0.7	0.0	0.6	0.0	1.3	0.2	2.7	1.4	1.7	0.7	0.9	0.8	34
N**	1'590	653	2'243	170	57	227	147	29	176	671	155	826	112	433	545	3'004	1'525	4'529	4'529
données manquantes	716	326	1'042	122	36	158	56	11	67	234	39	273	88	355	443	1'338	849	2'187	2'187
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	20.3	32.6	23.9	32.4	36.8	33.3	16.7	25.0	18.0	14.4	18.0	14.9	50.0	14.0	19.0	20.2	29.0	22.6	567
apprenti-e, stagiaire	2.1	2.0	2.1	3.4	5.3	3.8	4.6	0.0	3.9	34.5	22.0	32.8	0.0	0.0	0.0	8.9	4.4	7.7	193
manœuvre, aide	3.7	4.9	4.0	4.8	7.9	5.5	10.2	10.0	10.2	2.9	0.0	2.5	0.0	6.0	5.2	4.1	5.1	4.4	110
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.6	7.4	7.5	11.0	18.4	12.6	10.2	10.0	10.2	1.9	4.0	2.2	0.0	10.0	8.6	7.2	8.0	7.4	186
ouvrier/ère formé-e (CFC)	15.0	6.7	12.6	18.6	10.5	16.9	19.4	25.0	20.3	8.9	4.0	8.3	0.0	10.0	8.6	13.9	7.7	12.3	308
contremaître-sse	2.9	0.4	2.2	2.1	0.0	1.6	2.8	0.0	2.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	1.8	46
employé-e non qualifié-e	18.8	27.6	21.3	11.0	15.8	12.0	13.0	15.0	13.3	5.8	12.0	6.6	0.0	30.0	25.9	15.0	24.8	17.6	442
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.0	9.7	12.0	9.7	5.3	8.7	16.7	10.0	15.6	4.8	4.0	4.7	12.5	10.0	10.3	10.9	9.0	10.4	262
employé-e, cadre supérieur	5.1	2.0	4.2	1.4	0.0	1.1	0.0	5.0	0.8	1.0	0.0	0.8	12.5	4.0	5.2	3.6	1.8	3.1	79
indépendant-e	8.5	5.2	7.5	4.1	0.0	3.3	5.6	0.0	4.7	1.3	4.0	1.7	25.0	12.0	13.8	6.4	5.3	6.1	153
écolier/ère, étudiant-e	1.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	32.0	24.0	0.0	4.0	3.4	5.6	4.1	5.2	130
autre statut	2.0	0.4	1.6	1.4	0.0	1.1	0.9	0.0	0.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	1.5	38
N**	1'093	445	1'538	145	38	183	108	20	128	313	50	363	8	50	58	1'848	666	2'514	2'514
données manquantes	1'213	534	1'747	147	55	202	95	20	115	592	144	736	192	738	930	2'494	1'708	4'202	4'202

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T6 Source de revenu principale et taux d'activité à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale (au cours des 30 derniers jours)*																			
salaires	54.5	39.6	50.0	33.7	22.1	30.8	60.1	40.5	57.0	28.3	19.8	26.8	64.8	65.0	65.0	46.9	41.9	45.3	2'589
économies, épargne	2.2	0.9	1.8	1.6	0.0	1.2	0.5	2.7	0.9	0.7	0.5	0.7	0.0	0.5	0.4	1.6	0.7	1.3	77
rente (AVS, AI ou autre)	14.5	21.6	16.7	12.9	26.7	16.4	9.8	2.7	8.7	2.4	6.0	3.0	12.5	11.7	11.8	11.0	17.8	13.2	754
aide sociale	14.7	14.7	14.7	31.8	37.2	33.1	12.4	32.4	15.7	9.8	17.6	11.2	2.3	2.2	2.2	14.4	13.2	14.0	802
assurance-chômage	7.7	5.0	6.9	8.2	4.7	7.3	5.2	10.8	6.1	3.5	2.7	3.3	3.4	1.9	2.2	6.4	3.8	5.6	318
soutien du/de la partenaire	2.0	13.9	5.5	3.1	2.3	2.9	1.6	2.7	1.7	0.8	1.1	0.9	3.4	13.8	11.8	1.7	10.7	4.6	263
soutien parents/proches/amis	2.3	1.6	2.1	2.7	3.5	2.9	5.2	8.1	5.7	52.6	51.6	52.4	13.6	3.0	5.0	15.6	9.8	13.7	785
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	1.6	0.0	1.3	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
autres revenus illégaux	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
prostitution	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
assurance d'indemnités journalières	0.9	1.0	0.9	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	38
autre	1.2	1.7	1.4	2.7	1.2	2.3	2.1	0.0	1.7	1.1	0.5	1.0	0.0	1.9	1.5	1.2	1.4	1.3	73
N**	2'102	901	3'003	255	86	341	193	37	230	837	182	1'019	88	369	457	3'883	1'834	5'717	5'717
données manquantes	204	78	282	37	7	44	10	3	13	68	12	80	112	419	531	459	540	999	999
Taux d'activité principal (au cours des 30 derniers jours)*																			
activité à plein temps (dès 70%)	53.3	26.9	45.7	36.3	19.7	32.5	56.8	34.3	53.2	20.2	12.2	18.8	65.7	46.8	50.3	43.8	29.4	39.4	2'014
activité à temps partiel	5.5	23.7	10.7	2.1	12.7	4.6	2.7	8.6	3.7	1.9	4.1	2.3	3.0	34.5	28.6	4.3	22.0	9.6	492
jobs occasionnels	1.4	0.9	1.2	1.3	0.0	1.0	3.8	0.0	3.2	1.5	0.6	1.3	1.5	0.7	0.8	1.5	0.8	1.3	64
en formation	2.9	2.5	2.8	2.6	4.2	3.0	5.5	5.7	5.5	57.5	58.1	57.6	11.9	4.4	5.8	17.7	12.5	16.1	823
sans travail, en quête d'emploi	14.2	10.0	13.0	21.4	16.9	20.3	13.1	31.4	16.1	8.4	9.9	8.6	6.0	2.7	3.3	12.6	8.9	11.5	589
sans travail, sans recherche d'emploi	5.2	6.5	5.6	12.4	16.9	13.4	4.4	5.7	4.6	2.2	1.7	2.2	0.0	2.4	1.9	5.0	5.2	5.1	259
rentier/rentière	4.5	7.0	5.2	2.1	1.4	2.0	2.2	0.0	1.8	0.5	0.6	0.5	3.0	2.4	2.5	3.0	4.3	3.4	173
incapacité de travail	4.9	7.6	5.7	7.7	9.9	8.2	5.5	2.9	5.0	1.4	1.2	1.3	0.0	1.4	1.1	4.1	5.2	4.4	227
femme/homme au foyer	0.2	5.1	1.6	0.0	2.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	3.1	0.2	3.3	1.1	57
autre	7.9	9.7	8.4	14.1	15.5	14.4	6.0	11.4	6.9	6.5	11.6	7.4	4.5	2.0	2.5	7.9	8.4	8.0	411
N**	1'898	759	2'657	234	71	305	183	35	218	802	172	974	67	293	360	3'566	1'543	5'109	5'109
données manquantes	408	220	628	58	22	80	20	5	25	103	22	125	133	495	628	776	831	1'607	1'607

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T7 Revenu mensuel net et dettes à l'admission, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principale												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Revenu mensuel net (6 derniers mois)*																			
aucun revenu	39.4	48.2	41.5	54.1	52.9	53.8	24.5	33.3	25.9	53.7	76.0	56.4	100.0	82.5	85.3	43.8	60.7	48.2	618
moins de 1000 fr.	2.6	2.9	2.7	8.1	11.8	8.8	0.0	22.2	3.4	22.6	16.0	21.8	0.0	0.0	0.0	7.0	5.1	6.5	83
de 1001 à 2000 fr.	4.5	14.1	6.8	4.1	5.9	4.4	4.1	0.0	3.4	7.9	4.0	7.4	0.0	3.1	2.6	5.2	8.6	6.1	78
de 2001 à 3000 fr.	6.6	7.1	6.7	6.8	23.5	9.9	4.1	11.1	5.2	1.1	0.0	1.0	0.0	2.1	1.7	5.5	6.0	5.6	72
de 3001 à 4000 fr.	10.7	15.3	11.8	8.1	0.0	6.6	10.2	22.2	12.1	4.5	4.0	4.5	0.0	3.1	2.6	9.1	10.1	9.4	120
de 4001 à 5000 fr.	12.8	6.5	11.3	5.4	0.0	4.4	16.3	11.1	15.5	6.8	0.0	5.9	0.0	5.2	4.3	11.0	5.1	9.4	121
de 5001 à 6000 fr.	8.5	3.5	7.3	2.7	0.0	2.2	28.6	0.0	24.1	1.1	0.0	1.0	0.0	4.1	3.4	7.5	3.0	6.3	81
de 6001 à 8000 fr.	7.9	1.2	6.3	6.8	5.9	6.6	6.1	0.0	5.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.7	0.9	4.4	57
de 8001 à 10 000 fr.	5.1	1.2	4.1	4.1	0.0	3.3	6.1	0.0	5.2	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	4.1	0.6	3.2	41
de 10 001 à 15 000 fr.	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	7
plus de 15 000 fr.	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4
N**	531	170	701	74	17	91	49	9	58	177	25	202	19	97	116	946	336	1'282	1'282
données manquantes	1'775	809	2'584	218	76	294	154	31	185	728	169	897	181	691	872	3'396	2'038	5'434	5'434
Dettes*																			
aucune dette	67.6	73.0	69.1	46.7	40.0	45.0	46.8	44.4	46.6	86.4	83.0	85.7	80.8	93.1	90.6	69.6	75.5	71.3	1'554
jusqu'à 5000 fr.	3.6	4.3	3.8	2.2	6.7	3.3	5.1	22.2	6.8	2.7	6.6	3.5	7.7	2.0	3.1	4.1	5.6	4.5	99
de 5001 à 10 000 fr.	9.1	8.9	9.0	14.4	13.3	14.2	7.6	0.0	6.8	4.3	5.7	4.6	3.8	1.0	1.6	7.9	6.8	7.6	165
de 10 001 à 25 000 fr.	6.0	5.3	5.8	13.3	10.0	12.5	15.2	33.3	17.0	4.3	1.9	3.8	0.0	0.0	0.0	6.4	4.0	5.7	125
de 25 001 à 50 000 fr.	4.8	3.6	4.5	12.2	13.3	12.5	11.4	0.0	10.2	1.1	0.9	1.1	3.8	3.9	3.9	4.4	3.5	4.2	91
de 50 001 à 100 000 fr.	3.1	2.1	2.8	7.8	10.0	8.3	5.1	0.0	4.5	0.7	0.9	0.7	3.8	0.0	0.8	3.1	2.1	2.8	62
plus de 100 000 fr.	2.5	0.4	1.9	0.0	6.7	1.7	2.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	1.6	34
montant inconnu	3.3	2.5	3.1	3.3	0.0	2.5	6.3	0.0	5.7	0.5	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	2.3	50
N**	750	281	1'031	90	30	120	79	9	88	441	106	547	26	102	128	1'560	620	2'180	2'180
données manquantes	1'556	698	2'254	202	63	265	124	31	155	464	88	552	174	686	860	2'782	1'754	4'536	4'536

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T8 Emprisonnement ou détention préventive avant l'admission et durée totale de détention, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Emprisonnement ou détention préventive*																
aucun-e	90.3	95.9	92.0	51.3	75.0	55.3	68.6	75.0	69.2	82.2	90.0	83.0	85.4	94.2	87.7	865
emprisonnement	2.5	0.9	2.0	5.1	12.5	6.4	8.6	0.0	7.7	2.2	10.0	3.0	3.2	1.5	2.7	27
détention préventive	5.6	2.3	4.6	15.4	12.5	14.9	17.1	25.0	17.9	10.0	0.0	9.0	7.6	3.1	6.4	63
emprisonnement et détention préventive	1.5	0.9	1.4	28.2	0.0	23.4	5.7	0.0	5.1	5.6	0.0	5.0	3.9	1.2	3.1	31
N**	517	221	738	39	8	47	35	4	39	90	10	100	727	259	986	986
données manquantes	1'789	758	2'547	253	85	338	168	36	204	815	184	999	3'415	1'327	4'742	4'742
Durée totale de détention***																
jusqu'à 1 mois	42.3	50.0	42.9	9.1	0.0	7.7	44.4	0.0	44.4	83.3	0.0	83.3	37.5	25.0	36.7	22
> 1 à 2 mois	11.5	0.0	10.7	9.1	50.0	15.4	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	10.7	25.0	11.7	7
> 2 à 6 mois	26.9	50.0	28.6	18.2	50.0	23.1	22.2	0.0	22.2	16.7	0.0	16.7	21.4	50.0	23.3	14
> 6 à 12 mois	7.7	0.0	7.1	18.2	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.0	6
plus de 1 an	11.5	0.0	10.7	45.5	0.0	38.5	22.2	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	18.3	11
N**	26	2	28	11	2	13	9	0	9	6	0	6	56	4	60	60
données manquantes	24	7	31	8	0	8	2	1	3	10	1	11	50	11	61	61

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de détention. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T9 Instance d'envoi principale, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			N
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Instance d'envoi principale*																			
condamnation/mesure/justice/police	17.3	6.4	14.0	15.8	8.3	14.0	20.8	14.3	19.7	50.9	39.1	48.7	0.6	1.1	1.0	22.9	7.2	17.3	1'044
cabinet médical	8.8	14.0	10.4	13.8	15.5	14.2	6.7	8.6	7.0	3.3	3.3	3.3	3.4	4.6	4.4	7.6	9.3	8.2	492
institution spécialisée dans les addictions	7.2	9.8	8.0	11.5	21.4	14.0	5.6	5.7	5.6	1.3	2.2	1.5	2.8	2.9	2.9	5.6	6.8	6.0	363
autre service médical/social/de santé	16.8	20.8	18.0	11.9	7.1	10.8	10.7	11.4	10.8	7.5	9.2	7.8	7.4	3.2	4.0	13.2	12.6	13.0	784
institution formatrice/éducative	0.6	0.5	0.5	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.9	9.2	4.9	0.6	0.7	0.7	1.9	2.0	1.9	116
employeur/employeuse	4.6	2.3	3.9	1.9	0.0	1.5	1.1	2.9	1.4	1.8	1.1	1.7	1.7	1.0	1.1	3.3	1.5	2.7	162
initiative personnelle/famille/amis	43.4	45.3	44.0	42.3	44.0	42.7	52.2	54.3	52.6	29.9	33.2	30.5	81.8	84.6	84.1	43.6	58.8	49.0	2'954
autre	1.3	1.0	1.2	2.3	3.6	2.6	2.8	2.9	2.8	1.2	2.7	1.5	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	111
N**	2'060	880	2'940	260	84	344	178	35	213	815	184	999	176	697	873	3'879	2'147	6'026	6'026
données manquantes	246	99	345	32	9	41	25	5	30	90	10	100	24	91	115	463	227	690	690

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T10 Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire et type de mesure, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Prise en charge consécutive à une mesure judiciaire*																
non, pas de mesure	86.5	95.0	89.0	89.2	90.3	89.4	94.7	93.3	94.5	64.0	74.5	65.5	83.5	93.2	86.0	1'964
suspension/ renonciation/ réprimande (art 19a ch2 LStup)	0.8	0.0	0.5	0.8	3.2	1.3	1.1	0.0	0.9	9.3	6.4	8.9	2.2	0.9	1.9	43
oui, consécutive à une mesure	12.8	5.0	10.5	10.0	6.5	9.3	4.3	6.7	4.6	26.6	19.1	25.6	14.3	6.0	12.1	277
N**	1'050	436	1'486	120	31	151	94	15	109	289	47	336	1'696	588	2'284	2'284
données manquantes	1'256	543	1'799	172	62	234	109	25	134	616	147	763	2'446	998	3'444	3'444
Type de mesure judiciaire***																
mes. protect. méd. (art 19a ch3 LStup)	4.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	20.0	5.0	3.6	4.3	3.7	6
mes. thérapeutiques institutionnelles (art 59 CP)	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.5	0.7	4.3	1.2	2
traitement résidentiel (art 60 CP)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
prise en charge ambulatoire	18.9	17.6	18.7	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	48.6	40.0	47.5	30.4	26.1	29.8	48
placement dans institution pour jeunes adultes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
en attente d'un jugement	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0	20.0	8.0	0.0	6.8	11
autre	75.6	82.4	76.6	33.3	0.0	33.3	100.0	0.0	100.0	25.7	20.0	25.0	58.7	65.2	59.6	96
N**	90	17	107	3	0	3	1	0	1	35	5	40	138	23	161	161
données manquantes	52	5	57	10	3	13	4	1	5	69	7	76	142	17	159	159

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T11 Traitements/prises en charge avant l'admission et type de prises en charge antérieures, selon le problème principal et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Proches			Toutes prises en charge			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Prises en charge antérieures*																			
non	47.0	39.8	44.8	13.9	14.3	14.0	42.4	56.3	44.6	76.9	79.0	77.3	65.6	70.7	69.7	53.1	50.5	52.3	2'839
oui	53.0	60.2	55.2	86.1	85.7	86.0	57.6	43.8	55.4	23.1	21.0	22.7	34.4	29.3	30.3	46.9	49.5	47.7	2'592
N**	2'050	886	2'936	259	84	343	172	32	204	824	176	1'000	61	276	337	3'737	1'694	5'431	5'431
<i>données manquantes</i>	256	93	349	33	9	42	31	8	39	81	18	99	139	512	651	605	680	1'285	1'285
Type de prise en charge***																			
traitement avec prescription d'héroïne	1.1	0.8	1.0	4.3	6.3	4.8	1.9	0.0	1.7	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.2	20
substitution (méthadone, subutex)	6.0	5.3	5.8	58.1	75.0	62.4	17.3	12.5	16.7	5.2	0.0	4.3	11.1	4.1	5.5	11.5	9.1	10.7	180
autre traitement médicamenteux	7.3	5.1	6.6	8.6	12.5	9.6	9.6	0.0	8.3	1.7	0.0	1.4	11.1	5.5	6.6	6.8	5.3	6.3	106
prise en charge ambulatoire	72.7	68.5	71.3	66.7	53.1	63.2	75.0	25.0	68.3	84.3	80.0	83.6	83.3	90.4	89.0	73.6	72.2	73.1	1'233
structure/clinique de jour	1.5	2.0	1.6	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.2	20
traitement résidentiel	45.7	52.5	47.9	35.5	40.6	36.8	36.5	37.5	36.7	21.7	20.0	21.4	22.2	23.3	23.1	40.0	44.0	41.3	697
sev rage	44.3	43.5	44.0	50.5	56.3	52.0	34.6	25.0	33.3	12.2	8.0	11.4	27.8	13.7	16.5	39.0	34.5	37.5	632
groupe d'entraide ou d'auto-support	5.2	6.7	5.7	4.3	0.0	3.2	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	1.1	4.4	4.6	4.4	75
autre(s)	2.3	2.2	2.3	0.0	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	6.1	8.0	6.4	5.6	2.7	3.3	2.6	2.6	2.6	44
N**	750	356	1'106	93	32	125	52	8	60	115	25	140	18	73	91	1'116	571	1'687	1'687
<i>données manquantes</i>	345	183	528	130	40	170	47	6	53	80	13	93	4	10	14	655	279	934	934

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant une expérience de prise en charge antérieure. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T12 Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaine et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution ou prescription d'héroïne à l'admission*																
non	97.9	96.9	97.6	39.7	42.9	40.6	92.0	93.8	92.2	99.4	99.1	99.3	95.5	95.2	95.4	2'744
oui	2.1	3.1	2.4	60.3	57.1	59.4	8.0	6.3	7.8	0.6	0.9	0.7	4.5	4.8	4.6	131
N**	1'211	517	1'728	73	28	101	87	16	103	471	110	581	2'033	842	2'875	2'875
données manquantes	1'095	462	1'557	219	65	284	116	24	140	434	84	518	2'109	744	2'853	2'853
Type de substitution/prescription***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	2
méthadone	80.8	87.5	83.3	86.4	86.7	86.4	80.0	100.0	83.3	100.0	100.0	100.0	83.1	87.2	84.4	108
autres opiacés	15.4	12.5	14.3	4.5	13.3	6.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	11.2	12.8	11.7	15
autres substances	3.8	0.0	2.4	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	3
N**	26	16	42	44	15	59	5	1	6	3	1	4	89	39	128	128
données manquantes	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	2	1	3	3
Traitement de substitution dans la vie?*																
non	94.4	96.0	94.9	34.9	35.1	34.9	85.1	91.7	86.2	98.6	98.7	98.6	89.5	91.9	90.1	2'989
oui	5.6	4.0	5.1	65.1	64.9	65.1	14.9	8.3	13.8	1.4	1.3	1.4	10.5	8.1	9.9	327
N**	1'419	622	2'041	192	57	249	121	24	145	429	77	506	2'404	912	3'316	3'316
données manquantes	887	357	1'244	100	36	136	82	16	98	476	117	593	1'738	674	2'412	2'412
Age lors du premier traitement de substitution****																
Moyenne	29.9	22.1	28.3	28.0	25.8	27.6	26.6	24.5	26.1	-	-	-	28.1	25.1	27.5	
Ecart-type	9.2	7.9	9.4	6.5	4.7	6.2	6.7	7.8	6.5	-	-	-	7.3	6.4	7.2	
25 centile	25.0	18.0	22.0	23.0	22.5	23.0	21.0	19.0	21.0	-	-	-	23.0	19.0	23.0	
Médiane	28.0	18.5	26.0	27.0	24.5	26.0	25.0	24.5	25.0	-	-	-	26.5	24.0	26.0	
75 centile	32.0	24.0	32.0	32.0	30.5	32.0	30.0	30.0	30.0	-	-	-	32.0	30.0	31.0	
N**	33	8	41	67	16	83	7	2	9	0	0	0	118	29	147	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant signalé un traitement de substitution ou de prescription d'héroïne à l'admission. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant eu une expérience de substitution au cours de leur vie

T13 Problème principal à l'admission (seulement patient-e-s) (2013)

Tous patients et patientes										
	Hommes				Femmes				Total	
	%	%	%	N	%	%	%	N		
Problème principal*										
alcool	55.7	61.7	57.3	3'285	alcool	55.7	61.7	57.3	3'285	
héroïne	6.0	4.3	5.6	318						
méthadone	0.8	0.9	0.8	47						
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	1	opioïdes	7.0	5.9	6.7	385	
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0						
autres opioïdes	0.2	0.6	0.3	19						
cocaïne en poudre	4.8	2.5	4.1	237						
crack	0.1	0.1	0.1	6	cocaïne ou dérivés	4.9	2.5	4.2	243	
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0						
amphétamines	0.7	0.9	0.7	42						
méthamphétamines	0.1	0.0	0.1	5						
MDMA et substances similaires (ecstasy)	0.3	0.6	0.4	24	stimulants	1.3	1.6	1.3	77	
cathinones synthétiques	0.1	0.0	0.1	4						
autres stimulants	0.0	0.1	0.0	2						
barbituriques	0.0	0.1	0.0	2						
benzodiazépines	0.7	1.6	0.9	53	hypnotiques/sédatifs	0.7	2.1	1.1	64	
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0						
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.4	0.2	9						
LSD	0.1	0.0	0.1	4						
kétamine	0.0	0.0	0.0	0	hallucinogènes	0.1	0.0	0.1	5	
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	1						
cannabis	21.8	12.2	19.2	1'099	cannabis	21.8	12.2	19.2	1'099	
tabac	2.5	4.6	3.1	178	tabac	2.5	4.6	3.1	178	
substances volatiles	0.0	0.1	0.0	1	autres substances	0.6	0.3	0.5	27	
autre substance	0.6	0.2	0.5	26						
jeu pathologique	2.4	1.5	2.1	122						
dépendances aux ordinateurs/Internet	1.0	0.2	0.8	45	comportement de type	5.3	9.1	6.4	365	
troubles alimentaires	0.3	5.2	1.6	94	addictif					
autre comportement de type addictif	1.6	2.3	1.8	104						
N**	4'142	1'586	5'728	5'728	4'142	1'586	5'728	5'728		
<i>données manquantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est p

T14 Usage de substances multiples et combinaisons de substances (2013)

Tous patients et patientes			
	Hommes	Femmes	Total
Trouble lié à l'usage de substances multiples selon la CIM 10*			
oui	11.2	11.2	11.2
non	88.8	88.8	88.8
N**	1'698	553	2'251
<i>données manquantes</i>	2'444	1'033	3'477
Combinaisons de substances les plus fréquentes***			
coc/alc	10.4	5.5	9.2
can/alc	9.8	5.5	8.8
tab/alc	6.4	12.7	7.9
tab/can/alc	8.1	5.5	7.5
som/alc	4.6	10.9	6.1
op/alc	4.6	5.5	4.8
coc/op/alc	2.9	1.8	2.6
som/op	2.9	1.8	2.6
can/coc/alc	3.5	0.0	2.6
som/op/alc	1.7	3.6	2.2
tab/can/coc/alc	2.3	1.8	2.2
coc/op	2.3	0.0	1.8
tab/op/alc	2.3	0.0	1.8
tab/coc/alc	1.7	1.8	1.8
tab/can/coc	2.3	0.0	1.8
stim/coc/op/alc	1.2	1.8	1.3
som/coc	1.2	1.8	1.3
can/coc	1.2	1.8	1.3
can/coc/op/alc	0.6	3.6	1.3
tab/som/alc	0.6	3.6	1.3
tab/som/op/alc	1.2	1.8	1.3
tab/can	1.2	1.8	1.3
tab/can/som/op/alc	1.2	1.8	1.3
tab/can/hall/coc/op/alc	1.2	1.8	1.3
autres combinaisons	24.9	23.6	24.6
N**	173	55	228
<i>données manquantes</i>	17	7	24

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.1a Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	42.3	43.1	13.7	14.3	62.5	0.0	28.9	84.6	60.0
4 à 6 jours par semaine	11.4	7.7	13.0	4.8	12.5	0.0	8.1	7.7	13.3
2 à 3 jours par semaine	12.2	12.4	18.6	21.4	0.0	0.0	17.8	5.5	26.7
1 jour par semaine ou moins	9.4	11.5	29.8	35.7	12.5	66.7	20.1	0.0	0.0
aucune consommation	24.7	25.4	24.8	23.8	12.5	33.3	25.1	2.2	0.0
N**	1'833	209	161	42	24	3	786	91	15
données manquantes	473	83	42	10	7	2	119	14	8

T15.1b Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	44.7	50.0	11.4	17.4	63.2	0.0	31.5	92.4	33.3
4 à 6 jours par semaine	14.3	4.8	8.6	13.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0
2 à 3 jours par semaine	12.9	8.1	28.6	13.0	5.3	0.0	13.9	1.5	0.0
1 jour par semaine ou moins	8.5	11.3	31.4	21.7	10.5	0.0	24.2	1.5	33.3
aucune consommation	19.7	25.8	20.0	34.8	21.1	0.0	22.4	4.5	33.3
N**	778	62	35	23	19	0	165	66	3
données manquantes	201	31	5	2	14	0	29	7	1

T15.1c Fréquence de consommation de la principale substance posant problème au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes et femmes

Fréquence de consommation 30 derniers jours (%)*									
chaque jour	43.0	44.6	13.3	15.4	62.8	0.0	29.3	87.9	55.6
4 à 6 jours par semaine	12.3	7.0	12.2	7.7	7.0	0.0	8.1	4.5	11.1
2 à 3 jours par semaine	12.4	11.4	20.4	18.5	2.3	0.0	17.1	3.8	22.2
1 jour par semaine ou moins	9.1	11.4	30.1	30.8	11.6	66.7	20.8	0.6	5.6
aucune consommation	23.2	25.5	24.0	27.7	16.3	33.3	24.6	3.2	5.6
N**	2'611	271	196	65	43	3	951	157	18
données manquantes	674	114	47	12	21	2	148	21	9

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T15.2a Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes

	Patient-e-s: problème principal			
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	17.5	43.3	0.0	64.7
4 à 6 jours par semaine	7.0	3.3	25.0	3.9
2 à 3 jours par semaine	22.8	20.0	0.0	7.8
1 jour par semaine ou moins	26.3	13.3	25.0	9.8
aucune manifestation	26.3	20.0	50.0	13.7
N**	57	30	4	51
<i>données manquantes</i>	42	12	8	16

T15.2b Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	0.0	100.0	63.2	44.4
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	17.5	3.7
2 à 3 jours par semaine	25.0	0.0	10.5	14.8
1 jour par semaine ou moins	18.8	0.0	5.3	14.8
aucune manifestation	56.3	0.0	3.5	22.2
N**	16	1	57	27
<i>données manquantes</i>	7	2	25	10

T15.2c Fréquence d'apparition du problème principal au cours des 30 derniers jours avant l'admission (2013), hommes et femmes

Fréquence d'apparition au cours des 30 derniers jours (%)*				
chaque jour	13.7	45.2	59.0	57.7
4 à 6 jours par semaine	5.5	3.2	18.0	3.8
2 à 3 jours par semaine	23.3	19.4	9.8	10.3
1 jour par semaine ou moins	24.7	12.9	6.6	11.5
aucune manifestation	32.9	19.4	6.6	16.7
N**	73	31	61	78
<i>données manquantes</i>	49	14	33	26

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T16.1a Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013),

Patients: principale substance posant problème									
Hommes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.3	21.1	21.5	18.8	25.8	18.0	14.9	15.5	24.9
écart-type	3.8	5.5	5.5	4.3	6.2	-	2.4	5.4	13.6
1er quartile	14.0	18.0	18.0	16.0	22.5	18.0	14.0	13.0	15.5
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	14.0	24.0
3e quartile	18.0	23.0	25.0	20.5	29.5	18.0	16.0	16.0	32.5
N*	1'054	188	126	36	8	1	627	60	16
données manquantes	1'252	104	77	16	23	4	278	45	7
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	22.4	23.5	24.4	19.8	23.8	-	15.7	16.8	50.0
écart-type	8.1	6.6	6.0	3.6	6.5	-	2.6	3.6	-
1er quartile	18.0	19.0	20.0	16.0	21.0	-	15.0	14.0	50.0
valeur médiane	20.0	21.0	23.0	19.5	22.0	-	15.0	16.0	50.0
3e quartile	25.0	28.0	28.0	23.0	27.0	-	16.0	19.0	50.0
N*	789	83	67	22	5	0	373	50	1
données manquantes	1'517	209	136	30	26	5	532	55	22
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	31.6	24.1	25.6	21.4	29.9	-	17.0	20.8	26.9
écart-type	12.3	7.1	7.3	4.5	8.2	-	4.1	10.4	12.7
1er quartile	21.0	19.0	20.0	18.0	25.0	-	15.0	15.0	16.5
valeur médiane	30.0	22.0	24.0	21.0	27.0	-	16.0	16.0	26.5
3e quartile	40.0	27.0	30.0	24.5	35.0	-	17.0	20.0	35.0
N*	1'096	167	117	40	11	0	560	55	16
données manquantes	1'210	125	86	12	20	5	345	50	7
Période de latence (en années)**									
moyenne	24.9	9.3	7.8	8.4	3.6	0.6	4.5	10.8	7.4
écart-type	13.1	7.3	6.3	7.9	1.8	-	5.6	12.3	5.6
1er quartile	14.4	3.7	2.6	1.8	2.3	0.6	1.3	2.0	3.6
valeur médiane	24.9	7.6	6.7	5.8	3.6	0.6	2.4	5.2	6.8
3e quartile	34.6	12.2	10.4	16.5	4.9	0.6	4.9	16.0	10.3
N*	448	29	50	18	2	1	473	40	9
données manquantes	510	7	23	8	2	0	160	21	1

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1b Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013),

Patientes: principale substance posant problème										
Femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances	
Age lors de la première consommation										
moyenne	17.7	21.6	17.7	16.3	31.3	-	14.8	16.1	15.0	
écart-type	5.6	8.4	3.5	2.0	14.4	-	2.9	2.5	-	
1er quartile	15.0	16.0	16.0	15.0	20.0	-	13.0	15.0	15.0	
valeur médiane	16.0	18.0	17.5	16.5	33.0	-	15.0	16.0	15.0	
3e quartile	19.0	24.0	20.0	18.0	40.0	-	15.0	17.0	15.0	
N*	417	55	30	18	14	0	142	36	1	
données manquantes	562	38	10	7	19	0	52	37	3	
Age lors du début de la consommation régulière										
moyenne	25.9	23.1	19.1	16.7	47.1	-	16.1	18.4	-	
écart-type	10.0	7.5	4.8	1.9	14.6	-	3.6	4.0	-	
1er quartile	18.0	17.5	15.5	15.0	37.5	-	15.0	16.0	-	
valeur médiane	23.0	22.0	18.0	17.0	49.0	-	15.0	18.0	-	
3e quartile	30.0	25.5	23.5	18.0	58.0	-	16.0	20.0	-	
N*	315	20	16	13	12	0	92	30	0	
données manquantes	664	73	24	12	21	0	102	43	4	
Age lors du début de la consommation problématique										
moyenne	35.6	23.3	19.8	17.5	42.5	-	16.8	21.4	15.0	
écart-type	12.7	8.2	4.3	2.2	16.0	-	4.9	8.1	-	
1er quartile	25.0	17.5	17.0	16.0	29.0	-	14.0	16.0	15.0	
valeur médiane	35.0	20.5	19.0	17.0	42.0	-	16.0	20.0	15.0	
3e quartile	45.0	25.5	23.0	19.0	53.0	-	17.0	24.0	15.0	
N*	515	52	26	17	16	0	137	34	1	
données manquantes	464	41	14	8	17	0	57	39	3	
Période de latence (en années)**										
moyenne	26.5	5.2	7.0	5.5	11.7	-	4.5	20.5	0.4	
écart-type	13.5	5.4	4.9	6.8	8.8	-	5.6	13.3	-	
1er quartile	16.9	1.7	4.2	1.1	5.4	-	1.5	3.8	0.4	
valeur médiane	27.0	3.5	6.1	2.0	7.6	-	2.5	23.3	0.4	
3e quartile	35.3	6.7	7.9	9.2	19.8	-	4.8	30.9	0.4	
N*	164	8	15	12	5	0	113	23	1	
données manquantes	189	4	3	1	2	0	26	18	2	

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.1c Âge lors de la première consommation, au début de la consommation régulière, de la consommation problématique et période de latence (2013), hommes et femmes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
Hommes & femmes	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
Age lors de la première consommation									
moyenne	16.7	21.2	20.8	18.0	29.3	18.0	14.9	15.7	24.4
écart-type	4.4	6.2	5.4	3.8	12.2	-	2.5	4.5	13.4
1er quartile	15.0	17.0	17.0	16.0	20.0	18.0	14.0	13.0	15.0
valeur médiane	16.0	20.0	20.0	17.0	26.0	18.0	15.0	15.0	20.0
3e quartile	18.0	24.0	23.0	19.0	37.0	18.0	15.0	16.0	30.0
N*	1'471	243	156	54	22	1	769	96	17
données manquantes	1'814	142	87	23	42	4	330	82	10
Age lors du début de la consommation régulière									
moyenne	23.4	23.4	23.3	18.7	40.2	-	15.8	17.4	50.0
écart-type	8.8	6.7	6.2	3.4	16.6	-	2.8	3.8	-
1er quartile	18.0	19.0	19.0	16.0	27.0	-	15.0	15.0	50.0
valeur médiane	20.0	21.0	22.0	18.0	39.0	-	15.0	16.5	50.0
3e quartile	27.0	27.0	27.0	20.0	50.0	-	16.0	20.0	50.0
N*	1'104	103	83	35	17	0	465	80	1
données manquantes	2'181	282	160	42	47	5	634	98	26
Age lors du début de la consommation problématique									
moyenne	32.9	23.9	24.6	20.3	37.4	-	17.0	21.0	26.2
écart-type	12.6	7.3	7.2	4.4	14.6	-	4.2	9.6	12.6
1er quartile	22.0	18.0	19.0	17.0	26.0	-	15.0	15.0	15.0
valeur médiane	30.0	22.0	23.0	19.0	35.0	-	16.0	17.0	24.0
3e quartile	40.0	26.0	30.0	23.0	49.0	-	17.0	21.0	35.0
N*	1'611	219	143	57	27	0	697	89	17
données manquantes	1'674	166	100	20	37	5	402	89	10
Période de latence (en années)**									
moyenne	25.3	8.4	7.6	7.2	9.4	0.6	4.5	14.3	6.7
écart-type	13.2	7.1	6.0	7.5	8.2	-	5.6	13.4	5.8
1er quartile	14.9	3.3	3.6	1.3	3.3	0.6	1.4	2.1	1.7
valeur médiane	25.7	6.8	6.2	4.2	5.4	0.6	2.4	9.3	5.5
3e quartile	34.8	11.4	10.2	12.5	19.8	0.6	4.9	24.5	10.3
N*	612	37	65	30	7	1	586	63	10
données manquantes	699	11	26	9	4	0	186	39	3

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première consommation de la substance posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2a Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), hommes

Patients: problème principal				
Hommes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Âge lors de la première apparition				
moyenne	23.5	15.6	25.4	15.8
écart-type	12.6	2.7	19.5	8.3
1er quartile	16.0	13.0	16.0	13.0
valeur médiane	20.0	15.0	17.0	14.0
3e quartile	27.0	18.0	20.0	16.0
N*	35	11	5	31
<i>données manquantes</i>	64	31	7	36
Âge lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	25.6	17.0	30.5	17.0
écart-type	7.7	1.4	19.9	9.3
1er quartile	19.0	16.0	18.5	13.0
valeur médiane	25.0	17.0	22.5	15.0
3e quartile	28.0	18.0	42.5	16.0
N*	15	2	4	23
<i>données manquantes</i>	84	40	8	44
Âge lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	29.9	20.0	30.9	19.6
écart-type	12.1	7.2	20.9	9.3
1er quartile	22.0	15.0	17.0	14.5
valeur médiane	28.0	17.0	20.0	17.0
3e quartile	35.0	24.0	60.0	20.0
N*	45	11	7	32
<i>données manquantes</i>	54	31	5	35
Période de latence (en années)**				
moyenne	9.7	11.7	-	5.0
écart-type	6.6	8.9	-	5.8
1er quartile	4.3	4.7	-	1.7
valeur médiane	8.6	9.7	-	2.8
3e quartile	14.9	17.2	-	5.1
N*	28	8	0	26
<i>données manquantes</i>	36	17	2	18

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2b Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), femmes

Patientes: problème principal				
Femmes	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Age lors de la première apparition				
moyenne	36.6	-	17.5	25.1
écart-type	17.9	-	6.4	19.7
1er quartile	20.0	-	14.0	13.0
valeur médiane	40.0	-	15.0	17.0
3e quartile	44.0	-	20.0	21.0
N*	5	0	36	17
<i>données manquantes</i>	18	3	46	20
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	41.3	-	18.6	24.9
écart-type	18.5	-	6.4	20.6
1er quartile	29.0	-	15.0	15.0
valeur médiane	42.0	-	16.0	16.0
3e quartile	53.5	-	19.0	21.0
N*	4	0	25	13
<i>données manquantes</i>	19	3	57	24
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	41.8	-	21.7	28.2
écart-type	15.7	-	8.6	19.3
1er quartile	29.5	-	16.0	16.0
valeur médiane	42.0	-	19.0	20.5
3e quartile	55.0	-	23.0	35.0
N*	8	0	38	18
<i>données manquantes</i>	15	3	44	19
Période de latence (en années)**				
moyenne	11.6	-	9.3	10.0
écart-type	10.9	-	9.8	8.3
1er quartile	3.3	-	2.7	4.1
valeur médiane	8.7	-	5.9	6.7
3e quartile	19.9	-	13.3	16.2
N*	4	0	17	14
<i>données manquantes</i>	11	2	19	7

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T16.2c Âge lors de la première apparition du problème principal, de l'apparition régulière, de l'apparition problématique et période de latence (2013), hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
Hommes et femmes				
Age lors de la première apparition				
moyenne	25.2	15.6	18.4	19.1
écart-type	13.8	2.7	9.0	14.0
1er quartile	17.0	13.0	14.0	13.0
valeur médiane	20.5	15.0	16.0	14.5
3e quartile	29.0	18.0	20.0	18.0
N*	40	11	41	48
données manquantes	82	34	53	56
Age lors du début de l'apparition régulière				
moyenne	28.9	17.0	20.2	19.9
écart-type	12.1	1.4	9.8	14.6
1er quartile	19.0	16.0	15.0	14.0
valeur médiane	27.0	17.0	17.0	15.5
3e quartile	37.0	18.0	21.0	19.0
N*	19	2	29	36
données manquantes	103	43	65	68
Age lors du début de l'apparition problématique				
moyenne	31.7	20.0	23.2	22.7
écart-type	13.3	7.2	11.5	14.2
1er quartile	23.0	15.0	16.0	15.0
valeur médiane	30.0	17.0	19.0	17.0
3e quartile	38.0	24.0	25.0	23.0
N*	53	11	45	50
données manquantes	69	34	49	54
Période de latence (en années)**				
moyenne	10.0	11.7	9.3	6.7
écart-type	7.1	8.9	9.8	7.1
1er quartile	4.0	4.7	2.7	2.1
valeur médiane	8.6	9.7	5.9	3.5
3e quartile	14.9	17.2	13.3	7.8
N*	32	8	17	40
données manquantes	47	19	21	25

* Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

** Laps de temps entre la première apparition du comportement posant problème et le début de la prise en charge (seulement pour les personnes jamais prises en charge auparavant)

T17 Mode d'administration prédominant de la principale substance posant problème avant l'admission (2013)

Patient-e-s: principale substance posant problème																
Mode d'administration*	Héroïne			Cocaïne			Amphétamines			Cannabis			Benzodiazépines			
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
injection	34.7	39.5	35.7	5.3	6.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	
fumée/inhalation	44.1	34.9	42.3	10.5	6.1	9.7	15.0	8.3	12.5	99.1	97.4	98.8	4.8	0.0	2.5	
ingestion (manger/boire)	1.8	0.0	1.4	2.6	3.0	2.7	40.0	16.7	31.3	0.5	2.0	0.8	81.0	100.0	90.0	
sniff	19.4	25.6	20.7	80.9	84.8	81.6	40.0	75.0	53.1	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	7.5	
autre	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	5.0	0.0	3.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
N**	170	43	213	152	33	185	20	12	32	753	153	906	21	19	40	
<i>données manquantes</i>	<i>80</i>	<i>25</i>	<i>105</i>	<i>46</i>	<i>6</i>	<i>52</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>152</i>	<i>41</i>	<i>193</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T18.1 Prévalence à vie, sur les 30 derniers jours et sur les 12 derniers mois avant l'admission des injections et échange de matériel d'injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injections au cours de la vie*																
oui	5.6	5.1	5.5	63.9	65.6	64.3	14.2	16.7	14.6	2.7	0.6	2.3	9.9	8.1	9.4	390
non	94.0	94.5	94.1	35.6	32.8	35.0	85.1	83.3	84.8	97.2	98.2	97.4	89.8	91.4	90.2	3'753
ne veut pas répondre	0.4	0.4	0.4	0.5	1.6	0.7	0.7	0.0	0.6	0.1	1.2	0.3	0.3	0.5	0.4	16
N**	1'620	704	2'324	216	64	280	148	30	178	715	165	880	3'005	1'154	4'159	4'159
données manquantes	686	275	961	76	29	105	55	10	65	190	29	219	1'137	432	1'569	1'569
Injections au cours des 12 derniers mois*																
oui	0.5	1.2	0.7	30.6	34.9	31.6	6.5	10.3	7.2	0.3	0.0	0.2	2.5	2.4	2.5	99
non	99.5	98.8	99.3	69.4	65.1	68.4	93.5	89.7	92.8	99.7	100.0	99.8	97.5	97.6	97.5	3'844
N**	1'566	683	2'249	147	43	190	138	29	167	701	162	863	2'840	1'103	3'943	3'943
données manquantes	740	296	1'036	145	50	195	65	11	76	204	32	236	1'302	483	1'785	1'785
Injections au cours des 30 derniers jours*																
oui	0.5	0.7	0.6	23.9	24.5	24.0	5.0	10.3	5.9	0.3	0.0	0.2	2.1	1.8	2.0	80
non	99.5	99.3	99.4	76.1	75.5	76.0	95.0	89.7	94.1	99.7	100.0	99.8	97.9	98.2	98.0	3'944
N**	1'600	693	2'293	155	49	204	141	29	170	708	163	871	2'899	1'125	4'024	4'024
données manquantes	706	286	992	137	44	181	62	11	73	197	31	228	1'243	461	1'704	1'704
Echange de matériel d'injection au cours de la vie***																
oui	28.6	71.4	42.9	53.6	28.6	48.6	60.0	66.7	62.5	75.0	0.0	75.0	50.0	57.1	52.0	39
non	64.3	28.6	52.4	42.9	57.1	45.7	40.0	33.3	37.5	25.0	0.0	25.0	46.3	38.1	44.0	33
ne veut pas répondre	7.1	0.0	4.8	3.6	14.3	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.8	4.0	3
N**	14	7	21	28	7	35	5	3	8	4	0	4	54	21	75	75
données manquantes	68	26	94	86	30	116	14	1	15	12	1	13	203	63	266	266
Echange de matériel d'injection au cours des 12 derniers mois****																
oui	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	5.3	0.0	100.0	22.2	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	3.9	5
non	100.0	100.0	100.0	93.1	100.0	94.7	100.0	0.0	77.8	100.0	100.0	100.0	96.7	94.4	96.1	122
N**	36	17	53	29	9	38	7	2	9	10	1	11	91	36	127	127
données manquantes	46	16	62	85	28	113	12	2	14	6	0	6	166	48	214	214
Echange de matériel d'injection au cours des 30 derniers jours****																
oui	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
non	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	15
N**	0	2	2	9	2	11	1	0	1	0	0	0	11	4	15	15
données manquantes	82	31	113	105	35	140	18	4	22	16	1	17	246	80	326	326

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 12 derniers mois. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

***** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours des 30 derniers jours. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T18.2 Âge lors de la première injection, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: principale substance posant problème												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Age lors de la première injection*																
jusqu'à 14 ans	4.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.4	4
de 15 à 16 ans	4.8	26.7	10.5	7.0	12.5	8.2	37.5	0.0	27.3	0.0	100.0	7.7	7.1	20.0	10.2	17
de 17 à 18 ans	21.4	26.7	22.8	26.3	43.8	30.1	0.0	33.3	9.1	16.7	0.0	15.4	21.4	35.0	24.7	41
de 19 à 20 ans	21.4	26.7	22.8	17.5	6.3	15.1	0.0	0.0	0.0	41.7	0.0	38.5	21.4	12.5	19.3	32
de 21 à 25 ans	31.0	13.3	26.3	26.3	31.3	27.4	25.0	0.0	18.2	33.3	0.0	30.8	29.4	17.5	26.5	44
de 26 à 30 ans	11.9	0.0	8.8	10.5	6.3	9.6	12.5	66.7	27.3	8.3	0.0	7.7	10.3	7.5	9.6	16
de 31 à 39 ans	4.8	6.7	5.3	12.3	0.0	9.6	12.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.9	5.0	7.2	12
dès 40 ans	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	42	15	57	57	16	73	8	3	11	12	1	13	126	40	166	166
<i>données manquantes</i>	49	21	70	81	26	107	13	2	15	7	0	7	171	53	224	224

* Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant injecté au cours de leur vie. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T19.1a Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), hommes

Hommes

Patients: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	18.3	19.5	12.0	28.6	25.0	7.5	6.9	0.0
héroïne	1.1	2.0	5.9	4.0	32.1	0.0	0.4	2.0	0.0
méthadone	0.3	7.5	1.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.4	14.7	0.5	10.0	25.0	50.0	2.7	2.0	0.0
crack	0.2	0.4	2.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.1	0.4	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.6	1.2	2.7	8.0	3.6	25.0	1.5	1.0	0.0
méthamphétamines	0.2	0.8	0.5	6.0	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	0.8	1.1	16.0	0.0	50.0	1.8	1.0	5.9
cathinones synthétiques	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	1.7	4.8	3.2	4.0	3.6	0.0	0.4	1.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.9
LSD	0.1	1.2	1.6	6.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	4.7	17.1	18.4	18.0	21.4	50.0	-	8.8	5.9
tabac	9.7	20.2	14.1	12.0	10.7	25.0	10.6	-	5.9
autre substance	0.1	0.0	0.5	2.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
jeu pathologique	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	85.8	61.5	63.8	58.0	39.3	50.0	82.0	82.4	94.1
N**	2'074	252	185	50	28	4	851	102	17
données manquantes	232	40	18	2	3	1	54	3	6

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1b Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), femmes

Femmes

Patientes: principale substance posant problème									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	15.2	10.3	4.2	29.6	0.0	3.9	0.0	0.0
héroïne	0.8	2.5	5.1	4.2	3.7	0.0	1.1	1.4	0.0
méthadone	0.5	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.3	1.3	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.8	16.5	0.0	4.2	7.4	0.0	0.6	0.0	0.0
crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.2	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.3	1.3	0.0	8.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	3.1	15.2	0.0	4.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	2.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.7	20.3	12.8	4.2	3.7	0.0	-	0.0	0.0
tabac	7.7	20.3	12.8	4.2	11.1	0.0	7.2	-	0.0
autre substance	0.2	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	87.6	54.4	71.8	83.3	55.6	0.0	89.5	98.6	100.0
N**	879	79	39	24	27	0	181	70	3
<i>données manquantes</i>	100	14	1	1	6	0	13	3	1

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.1c Autres problèmes addictifs à l'admission selon la principale substance posant problème (2013), hommes et femmes

Hommes et femmes

	Patient-e-s: principale substance posant problème								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres problèmes*									
alcool	-	17.5	17.9	9.5	29.1	25.0	6.9	4.1	0.0
héroïne	1.0	2.1	5.8	4.1	18.2	0.0	0.5	1.7	0.0
méthadone	0.4	7.3	0.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.1	0.3	0.0	2.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	2.2	15.1	0.4	8.1	16.4	50.0	2.3	1.2	0.0
crack	0.2	0.3	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.1	0.3	0.9	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.5	1.2	3.6	5.4	1.8	25.0	1.3	0.6	0.0
méthamphétamines	0.2	0.6	0.4	4.1	0.0	50.0	0.1	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.4	0.9	0.9	13.5	1.8	50.0	1.5	0.6	5.0
cathinones synthétiques	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.1	0.3	0.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	2.1	7.3	2.7	4.1	3.6	0.0	0.3	0.6	0.0
GHB/GBL	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0
LSD	0.1	0.9	1.8	5.4	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	25.0	0.2	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
cannabis	4.1	17.8	17.4	13.5	12.7	50.0	-	5.2	5.0
tabac	9.1	20.2	13.8	9.5	10.9	25.0	10.0	-	5.0
autre substance	0.1	0.3	0.4	1.4	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0
jeu pathologique	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.3	0.0	0.4	0.0	1.8	0.0	0.2	0.0	0.0
autre comportement de type addictif	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun autre problème addictif	86.3	59.8	65.2	66.2	47.3	50.0	83.3	89.0	95.0
N**	2'953	331	224	74	55	4	1'032	172	20
données manquantes	332	54	19	3	9	1	67	6	7

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2a Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), hommes

Hommes

Patients: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	6.1	5.1	25.0	3.5
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.2	0.0	12.5	1.8
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	12.5	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.4	0.0	0.0	0.0
tabac	3.7	5.1	12.5	3.5
autre substance	0.0	0.0	12.5	3.5
jeu pathologique	-	5.1	12.5	0.0
dépendances aux ordinateurs/Internet	7.3	-	0.0	7.0
troubles alimentaires	0.0	2.6	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	2.6	0.0	-
aucun autre problème addictif	82.9	84.6	50.0	86.0
N**	82	39	8	57
<i>données manquantes</i>	17	3	4	10

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2b Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), femmes

Femmes

Patientes: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	Autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	0.0	0.0	6.1	0.0
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	1.5	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	4.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	0.0	0.0	1.5	0.0
tabac	0.0	0.0	1.5	0.0
autre substance	0.0	0.0	0.0	0.0
jeu pathologique	-	0.0	1.5	3.4
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	-	0.0	0.0
troubles alimentaires	0.0	33.3	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	33.3	0.0	-
aucun autre problème addictif	100.0	33.3	93.9	96.6
N**	18	3	66	29
<i>données manquantes</i>	5	0	16	8

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T19.2c Autres problèmes addictifs à l'admission selon le problème principal (non lié à une substance) (2013), hommes et femmes

Hommes et femmes

Patient-e-s: problème principal				
	Jeu pathologique	Dépendances aux ordinateurs/Internet	Troubles alimentaires	autre comportement de type addictif
	%		%	%
Autres problèmes*				
alcool	5.0	4.8	8.1	2.3
héroïne	0.0	0.0	0.0	0.0
méthadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	1.4	0.0
autres opioïdes	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaïne en poudre	1.0	0.0	1.4	1.2
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
autre forme de cocaïne	0.0	0.0	0.0	0.0
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
méthamphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazépines	0.0	0.0	4.1	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	1.4	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0
autres hallucinogènes	0.0	0.0	0.0	0.0
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0
cannabis	2.0	0.0	1.4	0.0
tabac	3.0	4.8	2.7	2.3
autre substance	0.0	0.0	1.4	2.3
jeu pathologique	-	4.8	2.7	1.2
dépendances aux ordinateurs/Internet	6.0	-	0.0	4.7
troubles alimentaires	0.0	4.8	-	0.0
autre comportement de type addictif	0.0	4.8	0.0	-
aucun autre problème addictif	86.0	81.0	89.2	89.5
N**	100	42	74	86
données manquantes	22	3	20	18

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T20.1a Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Tous problèmes principaux						
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif			N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alcool*	Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	45.0	36.4	43.1	30.0	50.0	32.4	12.7	33.3	14.8	85.7	28.6	57.1	10.0	0.0	7.1	27.7	30.3	28.2	53
4 à 6 jours par semaine	12.5	9.1	11.8	10.0	25.0	11.8	12.7	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	21.4	12.3	9.1	11.7	22
2 à 3 jours par semaine	12.5	27.3	15.7	43.3	0.0	38.2	21.8	16.7	21.3	0.0	14.3	7.1	0.0	25.0	7.1	20.0	21.2	20.2	38
1 jour par semaine ou moins	17.5	9.1	15.7	10.0	0.0	8.8	38.2	16.7	36.1	0.0	0.0	0.0	40.0	50.0	42.9	24.5	12.1	22.3	42
aucune consomm.	12.5	18.2	13.7	6.7	25.0	8.8	14.5	33.3	16.4	14.3	57.1	35.7	30.0	0.0	21.4	15.5	27.3	17.6	33
N**	40	11	51	30	4	34	55	6	61	7	7	14	10	4	14	155	33	188	188
données manquantes	252	82	334	173	36	209	850	188	1'038	24	26	50	210	141	351	4'187	2'341	6'528	6'528
Opioides*	Alcool			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	5.0	0.0	4.2	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.8	2
4 à 6 jours par semaine	5.0	25.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	20.0	7.7	4
2 à 3 jours par semaine	5.0	25.0	8.3	33.3	0.0	27.3	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	19.0	10.0	17.3	9
1 jour par semaine ou moins	20.0	0.0	16.7	22.2	0.0	18.2	33.3	0.0	25.0	25.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	26.2	10.0	23.1	12
aucune consomm.	65.0	50.0	62.5	33.3	100.0	45.5	66.7	100.0	75.0	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	45.2	60.0	48.1	25
N**	20	4	24	9	2	11	3	1	4	8	1	9	0	0	0	42	10	52	52
données manquantes	2'286	975	3'261	194	38	232	902	193	1'095	23	32	55	220	145	365	4'300	2'364	6'664	6'664
Cocaïne et dérivés*	Alcool			Opioides			Cannabis			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	4.8	14.3	7.1	0.0	9.1	2.9	5.9	0.0	5.6	16.7	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	4.1	10.3	5.6	7
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	4.3	9.1	5.9	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	3.2	4
2 à 3 jours par semaine	11.9	14.3	12.5	13.0	18.2	14.7	11.8	0.0	11.1	16.7	100.0	37.5	0.0	0.0	0.0	11.3	20.7	13.5	17
1 jour par semaine ou moins	26.2	28.6	26.8	43.5	36.4	41.2	17.6	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	30.9	27.6	30.2	38
aucune consomm.	57.1	42.9	53.6	39.1	27.3	35.3	64.7	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.5	37.9	47.6	60
N**	42	14	56	23	11	34	17	1	18	6	2	8	3	0	3	97	29	126	126
données manquantes	2'264	965	3'229	269	82	351	888	193	1'081	25	31	56	217	145	362	4'245	2'345	6'590	6'590
Cannabis*	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Hypnotiques/sédatifs			comportement addictif						
chaque jour	29.3	40.9	31.7	42.4	35.7	40.4	44.8	60.0	47.1	16.7	0.0	14.3	100.0	0.0	66.7	35.7	38.6	36.3	78
4 à 6 jours par semaine	12.2	27.3	15.4	15.2	7.1	12.8	17.2	0.0	14.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.0	15.9	14.4	31
2 à 3 jours par semaine	11.0	4.5	9.6	12.1	14.3	12.8	13.8	0.0	11.8	50.0	100.0	57.1	0.0	100.0	33.3	13.5	11.4	13.0	28
1 jour par semaine ou moins	13.4	22.7	15.4	9.1	21.4	12.8	3.4	20.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	22.7	14.0	30
aucune consomm.	34.1	4.5	27.9	21.2	21.4	21.3	20.7	20.0	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	11.4	22.3	48
N**	82	22	104	33	14	47	29	5	34	6	1	7	2	1	3	171	44	215	215
données manquantes	2'224	957	3'181	259	79	338	174	35	209	25	32	57	218	144	362	4'171	2'330	6'501	6'501

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T20.1b Fréquence de consommation des substances secondaires selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal															Tous problèmes principaux			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			comportement de type addictif			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Autres stimulants*																			
chaque jour	16.7	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	11.8	4
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.9	1
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	5.9	2
1 jour par semaine ou moins	8.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	50.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	26.7	25.0	26.5	9
aucune consomm.	75.0	100.0	76.9	100.0	0.0	100.0	0.0	33.3	25.0	36.4	0.0	36.4	0.0	0.0	0.0	53.3	50.0	52.9	18
N**	12	1	13	3	0	3	1	3	4	11	0	11	0	0	0	30	4	34	34
données manquantes	2'294	978	3'272	289	93	382	202	37	239	894	194	1'088	220	145	365	4'312	2'370	6'682	6'682
Hypnotiques/sédatifs*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
2 à 3 jours par semaine	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	1
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
aucune consomm.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
données manquantes	2'304	979	3'283	292	93	385	203	40	243	905	194	1'099	220	145	365	4'340	2'374	6'714	6'714
Hallucinogènes*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	27.8	5
aucune consomm.	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	68.8	100.0	72.2	13
N**	2	0	2	2	0	2	2	1	3	6	0	6	0	0	0	16	2	18	18
données manquantes	2'304	979	3'283	290	93	383	201	39	240	899	194	1'093	220	145	365	4'326	2'372	6'698	6'698
Autres substances*																			
chaque jour	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1
4 à 6 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2 à 3 jours par semaine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 jour par semaine ou moins	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	25.0	1
aucune consomm.	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	50.0	2
N**	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4	4
données manquantes	2'305	979	3'284	291	93	384	203	40	243	904	194	1'098	220	145	365	4'339	2'373	6'712	6'712

* En tant que problème secondaire; pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T21 Fréquence de la consommation d'alcool, nombre de boissons standards par jour et fréquence de fortes consommations d'alcool avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opiacés			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Fréquence de la consommation d'alcool*																
jamais	12.8	11.0	12.3	12.2	14.8	12.8	10.8	13.3	11.2	15.5	17.5	15.8	13.6	13.6	13.6	402
1 fois par mois ou moins	2.8	3.0	2.9	17.1	25.9	19.3	18.1	13.3	17.3	21.8	30.9	23.5	9.3	9.2	9.3	276
2 à 4 fois par mois	7.3	7.1	7.3	15.9	25.9	18.3	26.5	46.7	29.6	40.5	41.2	40.6	16.7	14.4	16.1	476
2 à 3 fois par semaine	16.9	16.2	16.7	26.8	14.8	23.9	25.3	13.3	23.5	17.3	8.2	15.6	17.3	15.9	16.9	502
4 fois ou plus par semaine	60.2	62.8	60.9	28.0	18.5	25.7	19.3	13.3	18.4	5.0	2.1	4.5	43.0	46.9	44.1	1'306
N**	1'381	575	1'956	82	27	109	83	15	98	440	97	537	2'151	811	2'962	2'962
données manquantes	925	404	1'329	210	66	276	120	25	145	465	97	562	1'991	775	2'766	2'766
Nbre de boissons standards par jour***																
1 ou 2	6.5	5.9	6.3	44.3	38.1	42.9	38.5	18.2	35.5	47.2	50.7	47.8	20.4	18.8	20.0	489
3 ou 4	18.4	17.2	18.1	24.3	38.1	27.5	36.9	54.5	39.5	37.1	42.7	38.1	23.5	21.9	23.0	564
5 ou 6	21.6	25.1	22.6	14.3	9.5	13.2	12.3	0.0	10.5	10.1	6.7	9.5	17.9	19.8	18.4	451
7 à 9	20.7	28.1	22.9	11.4	9.5	11.0	6.2	9.1	6.6	2.4	0.0	1.9	15.1	21.6	16.9	414
10 ou plus	32.7	23.8	30.1	5.7	4.8	5.5	6.2	18.2	7.9	3.3	0.0	2.7	23.0	18.0	21.7	530
N**	1'177	495	1'672	70	21	91	65	11	76	337	75	412	1'776	672	2'448	2'448
données manquantes	1'129	484	1'613	222	72	294	138	29	167	568	119	687	2'366	914	3'280	3'280
Fréquence de fortes consom. d'alcool***																
jamais	14.5	16.3	15.0	39.2	50.0	41.7	26.5	53.8	30.9	49.4	68.5	53.0	25.6	31.2	27.1	731
moins d'une fois par mois	9.7	12.4	10.5	24.3	22.7	24.0	36.8	7.7	32.1	32.1	22.8	30.4	17.0	13.5	16.0	432
1 fois par mois	10.6	9.2	10.2	9.5	9.1	9.4	14.7	7.7	13.6	9.5	2.2	8.1	10.3	8.3	9.8	263
1 fois par semaine	28.1	27.0	27.8	17.6	9.1	15.6	19.1	23.1	19.8	7.7	6.5	7.5	21.9	21.6	21.8	587
presque chaque jour	37.1	35.1	36.5	9.5	9.1	9.4	2.9	7.7	3.7	1.3	0.0	1.0	25.2	25.5	25.3	682
N**	1'262	533	1'795	74	22	96	68	13	81	389	92	481	1'945	750	2'695	2'695
données manquantes	1'044	446	1'490	218	71	289	135	27	162	516	102	618	2'197	836	3'033	3'033

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation d'alcool. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T22 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 derniers jours avant l'admission, selon le problème principal (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	34.5	33.1	34.1	1.3	8.0	2.9	25.0	13.3	23.1	21.4	17.0	20.6	27.9	29.7	28.4	699
1 jour par semaine ou moins	0.8	0.3	0.7	2.5	0.0	1.9	1.3	0.0	1.1	3.1	3.8	3.2	1.5	0.9	1.3	32
2 à 3 jours par semaine	0.4	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	4.6	2.8	4.3	1.7	1.5	1.6	40
4 à 6 jours par semaine	0.7	0.0	0.5	0.0	4.0	1.0	1.3	0.0	1.1	1.3	0.0	1.1	0.9	0.4	0.8	19
1 fois par jour	2.1	2.3	2.1	2.5	0.0	1.9	0.0	6.7	1.1	5.2	2.8	4.8	2.9	2.2	2.7	67
plusieurs fois par jour	61.5	62.9	61.9	93.7	88.0	92.3	71.1	80.0	72.5	64.4	73.6	66.1	65.1	65.4	65.2	1'607
N**	969	396	1'365	79	25	104	76	15	91	458	106	564	1'776	688	2'464	2'464
<i>données manquantes</i>	1'337	583	1'920	213	68	281	127	25	152	447	88	535	2'366	898	3'264	3'264
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10	15.4	20.1	16.8	10.0	22.7	13.0	30.8	27.3	30.2	47.8	58.3	50.0	25.0	29.0	26.1	414
11 à 20	41.0	47.4	42.9	58.6	45.5	55.4	42.3	45.5	42.9	43.2	34.5	41.4	44.5	44.7	44.6	706
21 à 30	30.2	26.1	29.0	24.3	18.2	22.8	21.2	18.2	20.6	6.8	6.0	6.6	21.5	19.7	21.0	333
31 ou plus	13.4	6.4	11.3	7.1	13.6	8.7	5.8	9.1	6.3	2.2	1.2	2.0	8.9	6.6	8.3	131
N**	559	234	793	70	22	92	52	11	63	324	84	408	1'143	441	1'584	1'584
<i>données manquantes</i>	76	31	107	8	1	9	5	2	7	36	4	40	138	43	181	181

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T23a Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), hommes

Patient-e-s: principale substance posant problème									
	Alcool	Opiacés	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Objectif de consommation*									
abstinence définitive	31.7	81.0	78.2	61.5	60.0	0.0	57.5	22.2	0.0
abstinence limitée dans le temps	22.9	3.8	3.6	15.4	10.0	0.0	8.2	5.6	0.0
consommation contrôlée	31.4	7.6	5.5	23.1	30.0	0.0	20.9	50.0	50.0
aucune limitation envisagée	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.6	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.6	7.6	12.7	0.0	0.0	0.0	11.2	16.7	50.0
autre	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	751	79	55	13	10	0	134	18	2
<i>données manquantes</i>	1'555	213	148	39	21	5	771	87	21

T23b Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	35.6	71.4	80.0	50.0	57.1	0.0	50.0	0.0	0.0
abstinence limitée dans le temps	14.6	7.1	0.0	25.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
consommation contrôlée	35.6	0.0	10.0	0.0	28.6	0.0	20.0	0.0	0.0
aucune limitation envisagée	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pas déterminé pour l'instant	12.7	21.4	10.0	25.0	14.3	0.0	20.0	100.0	0.0
autre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	267	14	10	4	7	0	20	1	0
<i>données manquantes</i>	712	79	30	21	26	0	174	72	4

T23c Objectif de consommation à l'admission face à la principale substance posant problème (2013), hommes et femmes

Objectif de consommation*									
abstinence définitive	32.7	79.6	78.5	58.8	58.8	0.0	56.5	21.1	0.0
abstinence limitée dans le temps	20.7	4.3	3.1	17.6	5.9	0.0	8.4	5.3	0.0
consommation contrôlée	32.5	6.5	6.2	17.6	29.4	0.0	20.8	47.4	50.0
aucune limitation envisagée	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	0.0
pas déterminé pour l'instant	11.9	9.7	12.3	5.9	5.9	0.0	12.3	21.1	50.0
autres	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'018	93	65	17	17	0	154	19	2
<i>données manquantes</i>	2'267	292	178	60	47	5	945	159	25

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24a Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), hommes

Hommes

Patients: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	26.4	21.9	25.0	18.2	33.3	0.0	23.5	16.7	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	28.0	32.8	30.0	36.4	55.6	0.0	26.5	8.3	100.0
diffic. compréhension/mémoire	11.5	7.8	17.5	0.0	22.2	0.0	21.4	16.7	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	10.6	10.9	12.5	0.0	44.4	0.0	22.4	8.3	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.7	0.0	7.5	0.0	11.1	0.0	1.0	0.0	0.0
réaction aiguë au stress sévère/troubles adaptation	5.3	4.7	10.0	0.0	11.1	0.0	4.1	8.3	0.0
hallucinations	0.8	1.6	5.0	0.0	11.1	0.0	5.1	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.6	9.4	10.0	18.2	11.1	0.0	15.3	8.3	100.0
problèmes psychiques traités avec médic.	25.2	21.9	22.5	18.2	66.7	0.0	12.2	25.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	10.2	6.3	12.5	9.1	11.1	0.0	7.1	8.3	0.0
tentatives de suicide	3.9	3.1	2.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
aucun	44.4	48.4	50.0	45.5	11.1	0.0	49.0	58.3	0.0
N**	489	64	40	11	9	0	98	12	1
<i>données manquantes</i>	<i>1'817</i>	<i>228</i>	<i>163</i>	<i>41</i>	<i>22</i>	<i>5</i>	<i>807</i>	<i>93</i>	<i>22</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24b Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), femmes

Femmes

Patientes: problème principal									
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	54.5	35.7	57.1	0.0	66.7	0.0	53.8	0.0	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	49.2	42.9	85.7	33.3	66.7	0.0	38.5	0.0	0.0
diffic. compréhension/mémoire	15.7	7.1	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	15.7	7.1	28.6	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.6	7.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	12.0	7.1	0.0	0.0	33.3	0.0	7.7	0.0	0.0
hallucinations	1.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	8.9	14.3	28.6	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
problèmes psychiques traités avec médic.	44.0	42.9	57.1	0.0	83.3	0.0	15.4	0.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	18.3	28.6	14.3	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
tentatives de suicide	8.9	21.4	14.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	4.2	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
aucun	17.3	21.4	0.0	33.3	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
N**	191	14	7	3	6	0	13	0	0
<i>données manquantes</i>	<i>788</i>	<i>79</i>	<i>33</i>	<i>22</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>181</i>	<i>73</i>	<i>4</i>

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T24c Problèmes psychiques au cours de la vie (2013), hommes et femmes

Hommes & femmes

	Patient-e-s: problème principal								
	Alcool	Opioides	Cocaïne et dérivés	Stimulants	Hypnotiques/sédatifs	Hallucinogènes	Cannabis	Tabac	Autres substances
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problèmes psychiques*									
autodévalorisation/sentiment de culpabilité	34.3	24.4	29.8	14.3	46.7	0.0	27.0	16.7	0.0
états anxieux/tension nerv. importants	34.0	34.6	38.3	35.7	60.0	0.0	27.9	8.3	100.0
diffic. compréhension/mémoire	12.6	7.7	19.1	0.0	13.3	0.0	20.7	16.7	0.0
altération de l'attention ou hyperactivité	12.1	10.3	14.9	7.1	26.7	0.0	21.6	8.3	0.0
pensées obsessionnelles/actions compulsives	2.6	1.3	8.5	0.0	6.7	0.0	0.9	0.0	0.0
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	7.2	5.1	8.5	0.0	20.0	0.0	4.5	8.3	0.0
hallucinations	0.9	1.3	6.4	0.0	6.7	0.0	5.4	0.0	0.0
diffic. à contrôler comportement violent	9.4	10.3	12.8	14.3	6.7	0.0	15.3	8.3	100.0
problèmes psychiques traités avec médic.	30.4	25.6	27.7	14.3	73.3	0.0	12.6	25.0	0.0
pensées suicidaires sérieuses	12.5	10.3	12.8	14.3	13.3	0.0	6.3	8.3	0.0
tentatives de suicide	5.3	6.4	4.3	7.1	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
autre(s) problème(s) psychique(s)	2.4	1.3	0.0	7.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
aucun	36.8	43.6	42.6	42.9	6.7	0.0	45.0	58.3	0.0
N**	680	78	47	14	15	0	111	12	1
données manquantes	2'605	307	196	63	49	5	988	166	26

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T25 Proches: lien entre le client/la cliente et la tierce personne (2013)

Proches				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Lien avec la tierce personne*				
mère/père	26.5	33.7	32.2	315
filles/fils	17.0	12.1	13.1	128
sœur/frère	6.5	3.7	4.3	42
conjoint-e/partenaire	37.5	44.8	43.3	423
autre proche/parent-e	4.0	1.8	2.3	22
collègue/ami-e	3.0	1.7	1.9	19
employeur/se, enseignant-e	1.5	0.1	0.4	4
tuteur/trice, curateur/trice	0.0	0.0	0.0	0
autre	4.0	2.1	2.5	24
N**	200	777	977	977
<i>données manquantes</i>	0	11	11	11

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T26 Proches: problème principal de la tierce personne (2013)

Proches		
	Total	
	%	N
Problème principal de la tierce personne*		
alcool	62.7	313
héroïne	4.4	22
méthadone	0.4	2
buprénorphine	0.0	0
fentanyl	0.0	0
autres opioïdes	0.0	0
cocaïne en poudre	6.0	30
crack	0.0	0
autre forme de cocaïne	0.2	1
amphétamines	1.0	5
méthamphétamines	0.2	1
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.6	3
cathinones synthétiques	0.0	0
autres stimulants	0.2	1
barbituriques	0.0	0
benzodiazépines	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
autres somnifères et tranquillisants	0.2	1
LSD	0.0	0
kétamine	0.0	0
autres hallucinogènes	0.0	0
substances volatiles	0.0	0
cannabis	13.6	68
tabac	0.8	4
autre substance	0.2	1
jeu pathologique	2.6	13
dépendances aux ordinateurs/Internet	4.0	20
troubles alimentaires	0.4	2
autre comportement de type addictif	1.8	9
N**	499	499
<i>données manquantes</i>	489	489

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues)

T27 Sexe et âge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																			
hommes			70.0			72.7			75.2			81.5			17.7			63.8	4'061
femmes			30.0			27.3			24.8			18.5			82.3			36.2	2'305
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'224	954	3'178	295	111	406	167	55	222	875	199	1'074	157	732	889	4'061	2'305	6'366	6'366
Age (en années)*																			
jusqu'à 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.6	3.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1	69
15-19	2.0	1.6	1.9	0.0	5.4	1.5	2.4	9.1	4.1	59.3	56.1	58.7	6.4	2.3	3.1	16.0	8.5	13.3	843
20-24	3.5	3.5	3.5	7.1	9.0	7.6	11.4	23.6	14.4	14.4	14.6	14.4	4.5	5.8	5.5	7.2	7.0	7.2	455
25-29	6.7	4.5	6.0	16.6	17.1	16.7	21.6	23.6	22.1	9.7	8.1	9.4	4.5	7.2	6.7	9.1	7.1	8.4	532
30-34	11.2	7.4	10.1	18.0	18.9	18.2	22.2	18.2	21.2	7.1	8.1	7.3	5.7	9.8	9.0	11.0	9.4	10.4	662
35-39	9.4	8.2	9.0	16.3	13.5	15.5	16.2	7.3	14.0	2.6	1.5	2.4	6.4	5.9	6.0	8.2	7.1	7.8	497
40-44	13.9	12.3	13.4	19.7	15.3	18.5	15.0	10.9	14.0	1.8	3.0	2.1	5.7	12.2	11.1	11.3	11.2	11.2	715
45-49	15.3	17.6	16.0	12.5	16.2	13.5	7.2	7.3	7.2	1.1	2.5	1.4	17.8	17.1	17.2	11.3	14.6	12.5	793
50-54	12.8	16.6	13.9	7.1	0.9	5.4	3.6	0.0	2.7	0.6	0.0	0.5	17.8	13.1	13.9	8.9	11.9	10.0	633
55-59	10.3	13.0	11.1	2.0	1.8	2.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	10.8	10.3	10.4	6.7	9.4	7.6	486
60-64	7.7	6.9	7.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	6.0	4.7	5.4	5.0	315
65-69	4.3	4.9	4.5	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	7.0	4.3	4.8	2.8	4.0	3.2	204
70-74	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.0	3.4	1.5	2.0	1.7	106
75 et plus	0.8	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.8	0.5	1.2	0.7	47
N**	2'221	954	3'175	295	111	406	167	55	222	875	198	1'073	157	727	884	4'058	2'299	6'357	6'357
données manquantes	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	9
Age (valeurs centrales)																			
moyenne	45.9	47.8	46.5	37.7	36.0	37.3	34.3	30.5	33.3	21.7	22.0	21.8	47.3	45.7	46.0	38.6	42.7	40.1	
écart-type	13.0	12.8	13.0	9.1	10.3	9.4	8.6	8.3	8.7	7.7	8.3	7.8	15.6	14.4	14.6	15.4	15.4	15.5	
1er quartile	36.0	40.0	37.0	30.6	28.5	29.7	27.8	24.3	26.7	17.0	17.0	17.0	37.5	34.2	34.5	25.4	30.5	27.5	
valeur médiane	46.0	48.3	46.9	37.8	34.9	37.3	33.1	28.5	32.5	18.3	18.3	18.3	49.4	47.1	47.3	38.5	44.4	40.9	
3e quartile	55.2	56.5	55.7	44.4	43.6	44.3	40.8	36.1	39.6	24.7	24.4	24.6	56.9	55.6	56.0	50.0	53.9	51.5	
N**	2'221	954	3'175	295	111	406	167	55	222	875	198	1'073	157	727	884	4'058	2'299	6'357	
données manquantes	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	3	6	9	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T28 État civil et degré d'urbanisation du domicile à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
État civil*																			
célibataire	41.1	32.8	38.5	73.5	68.0	72.0	66.3	66.7	66.4	94.4	87.0	93.0	28.2	23.2	24.1	57.5	40.9	51.5	1'978
marié-e	30.6	27.7	29.7	11.4	6.0	9.9	18.1	16.7	17.7	3.7	5.3	4.0	52.6	53.0	52.9	22.9	30.2	25.6	982
séparé-e	5.6	7.5	6.2	1.5	6.0	2.7	6.0	0.0	4.4	0.6	1.5	0.7	3.8	6.8	6.3	4.0	5.8	4.6	177
divorcé-e	20.3	26.1	22.1	10.6	14.0	11.5	9.6	16.7	11.5	1.1	6.1	2.1	12.8	14.8	14.4	13.9	19.1	15.8	605
veuf / veuve	1.9	5.7	3.1	1.5	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	2.6	1.9	2.0	1.4	3.7	2.2	85
partenariat enregistré	0.4	0.3	0.4	1.5	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	14
N**	1'401	629	2'030	132	50	182	83	30	113	537	131	668	78	366	444	2'454	1'387	3'841	3'841
données manquantes	823	325	1'148	163	61	224	84	25	109	338	68	406	79	366	445	1'607	918	2'525	2'525
Degré d'urbanisation*																			
grands centres urbains	11.0	12.2	11.3	9.2	4.3	7.8	2.0	5.4	2.9	1.5	0.7	1.3	25.0	16.8	18.3	8.3	10.6	9.1	411
périphérie des grands centre:	16.3	14.1	15.7	11.5	22.9	14.8	8.8	8.1	8.6	10.0	10.1	10.0	5.4	9.3	8.7	13.2	11.8	12.7	575
villes de moyenne importanc	19.2	17.0	18.5	14.9	14.3	14.8	33.3	21.6	30.2	30.9	30.2	30.8	18.5	21.5	21.0	22.5	21.6	22.2	1'002
petites villes	28.1	30.3	28.8	42.0	40.0	41.4	29.4	43.2	33.1	31.1	28.9	30.6	21.7	22.7	22.5	30.5	28.8	29.9	1'352
campagne	25.4	26.4	25.7	22.4	18.6	21.3	26.5	21.6	25.2	26.5	30.2	27.2	29.3	29.7	29.6	25.5	27.2	26.1	1'181
N**	1'678	716	2'394	174	70	244	102	37	139	618	149	767	92	428	520	2'917	1'604	4'521	4'521
données manquantes	546	238	784	121	41	162	65	18	83	257	50	307	65	304	369	1'144	701	1'845	1'845

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T29 Type de ménage, situation de domicile et type de relation de couple à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

Type de ménage*	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Type de ménage*																			
seul-e en ménage	40.9	38.9	40.3	46.7	27.9	41.2	27.1	22.6	26.2	11.5	11.6	11.5	28.8	20.0	21.6	31.6	29.8	31.0	1'281
avec famille d'origine	5.8	4.3	5.3	13.3	14.7	13.7	16.1	16.1	16.1	68.5	54.2	65.8	6.1	5.8	5.8	24.8	13.5	20.9	864
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	44.8	50.2	46.5	24.2	39.7	28.8	42.4	38.7	41.6	8.3	15.5	9.6	62.1	71.9	70.1	33.6	47.9	38.5	1'593
avec des amis ou d'autres personnes	2.4	2.5	2.4	3.0	2.9	3.0	5.1	9.7	6.0	3.2	1.9	3.0	3.0	0.7	1.1	2.8	2.4	2.7	110
en prison	0.2	0.1	0.2	3.0	0.0	2.1	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	12
institution/foyer	1.9	1.6	1.8	4.8	4.4	4.7	4.2	3.2	4.0	3.4	4.5	3.6	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	2.3	94
hôpital/clinique	0.4	0.1	0.3	0.6	5.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	14
autre	3.5	2.2	3.1	4.2	4.4	4.3	4.2	9.7	5.4	4.9	12.3	6.3	0.0	1.7	1.4	3.9	4.1	4.0	165
N**	1'456	681	2'137	165	68	233	118	31	149	654	155	809	66	295	361	2'702	1'431	4'133	4'133
données manquantes	768	273	1'041	130	43	173	49	24	73	221	44	265	91	437	528	1'359	874	2'233	2'233
Situation de domicile*																			
logement stable	93.3	94.5	93.7	80.4	75.9	79.1	87.7	78.9	85.6	92.1	87.4	91.2	96.3	96.9	96.8	92.1	93.0	92.4	4'278
logement instable/SDF	3.9	4.1	4.0	6.7	7.6	7.0	7.4	18.4	10.0	3.8	5.7	4.2	3.8	2.6	2.8	4.2	4.2	4.2	195
en prison	0.4	0.0	0.3	2.1	1.3	1.8	0.8	0.0	0.6	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	17
institution/foyer/hôpital/autre	2.3	1.3	2.0	10.8	15.2	12.1	4.1	2.6	3.8	3.8	6.3	4.3	0.0	0.6	0.5	3.2	2.6	3.0	140
N**	1'668	751	2'419	194	79	273	122	38	160	708	174	882	80	351	431	3'025	1'605	4'630	4'630
données manquantes	556	203	759	101	32	133	45	17	62	167	25	192	77	381	458	1'036	700	1'736	1'736
Type de relation de couple*																			
sans partenaire, seul-e	36.8	39.3	37.6	64.9	35.7	56.1	40.0	47.8	42.0	73.6	55.8	69.6	26.2	25.8	25.9	45.9	36.9	42.6	1'175
relations temporaires	5.5	5.6	5.5	5.2	4.8	5.0	4.6	4.3	4.5	6.4	10.5	7.3	4.9	2.2	2.7	5.6	5.1	5.4	149
partenaire fixe, vivant séparé	9.5	9.8	9.6	5.2	9.5	6.5	13.8	17.4	14.8	8.2	20.0	10.8	6.6	11.2	10.4	9.2	12.1	10.3	283
partenaire fixe, ménage commun	48.3	45.3	47.3	24.7	50.0	32.4	41.5	30.4	38.6	11.8	13.7	12.2	62.3	60.7	61.0	39.3	45.9	41.8	1'152
N**	1'044	481	1'525	97	42	139	65	23	88	330	95	425	61	267	328	1'733	1'026	2'759	2'759
données manquantes	1'180	473	1'653	198	69	267	102	32	134	545	104	649	96	465	561	2'328	1'279	3'607	3'607

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T30 Source de revenu principale et taux d'activité principal à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Source de revenu principale*																			
salaire	55.1	42.6	51.2	31.3	23.6	29.0	60.2	25.8	51.3	25.7	20.7	24.7	70.0	66.0	66.7	46.7	44.8	46.0	1'758
économies, épargne	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.3	0.2	1.0	0.7	0.9	35
rente (AVS, AI ou autre)	17.3	21.8	18.7	26.7	25.5	26.3	9.1	19.4	11.8	3.4	7.1	4.1	10.0	9.8	9.8	13.6	17.4	14.9	571
aide sociale	16.8	15.4	16.3	33.6	32.7	33.3	15.9	35.5	21.0	8.8	20.7	11.1	6.3	3.6	4.1	15.2	13.2	14.5	555
assurance-chômage	4.6	2.8	4.0	1.5	1.8	1.6	4.5	9.7	5.9	1.8	3.6	2.1	1.3	1.5	1.4	3.4	2.3	3.0	116
soutien du/de la partenaire	1.2	11.7	4.4	1.5	5.5	2.7	1.1	0.0	0.8	0.7	0.7	0.7	6.3	12.4	11.2	1.1	9.4	4.1	156
soutien parents/proches/amis	1.9	2.8	2.2	2.3	5.5	3.2	8.0	9.7	8.4	57.9	45.7	55.4	6.3	5.3	5.5	17.4	10.4	14.9	570
deal, petit trafic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres revenus illégaux	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assurance indemnités journalières	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
autre	1.3	1.6	1.4	3.1	1.8	2.7	1.1	0.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.0	1.2	1.0	1.1	1.4	1.2	46
N**	1'390	618	2'008	131	55	186	88	31	119	560	140	700	80	338	418	2'460	1'363	3'823	3'823
données manquantes	834	336	1'170	164	56	220	79	24	103	315	59	374	77	394	471	1'601	942	2'543	2'543
Taux d'activité principal*																			
activ. à plein temps (dès 70%)	53.1	32.4	46.8	36.8	25.7	33.8	55.6	28.0	48.5	16.1	12.8	15.5	67.6	44.3	49.1	42.5	33.2	39.3	1'195
activité à temps partiel	5.9	21.4	10.6	2.1	2.9	2.3	4.2	16.0	7.2	3.4	6.0	3.9	8.5	29.7	25.3	5.1	20.2	10.4	316
jobs occasionnels	1.4	2.3	1.7	5.3	2.9	4.6	1.4	0.0	1.0	1.9	0.9	1.7	0.0	0.4	0.3	1.7	1.3	1.6	48.0
en formation	3.2	4.0	3.5	2.1	8.6	3.8	8.3	4.0	7.2	60.9	58.1	60.4	4.2	6.6	6.1	19.6	13.6	17.5	531
sans travail, en quête d'emploi	7.8	7.6	7.8	6.3	20.0	10.0	8.3	16.0	10.3	5.3	6.8	5.6	1.4	3.3	2.9	6.7	6.5	6.6	202
sans travail, sans recherche d'emploi	4.3	2.7	3.8	12.6	11.4	12.3	4.2	4.0	4.1	2.8	5.1	3.2	1.4	0.4	0.6	4.3	2.4	3.7	111
rentier/rentière	9.7	11.3	10.2	3.2	2.9	3.1	0.0	4.0	1.0	0.6	0.0	0.5	8.5	10.3	9.9	6.3	9.2	7.3	222
incapacité de travail	4.0	6.1	4.6	12.6	11.4	12.3	6.9	8.0	7.2	1.5	1.7	1.5	0.0	1.5	1.2	3.5	4.3	3.8	116
femme/homme au foyer	0.2	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.8	1.7	0.2	1.8	0.7	22
autre	10.4	9.2	10.1	18.9	14.3	17.7	11.1	20.0	13.4	7.4	8.5	7.7	7.0	1.8	2.9	10.1	7.3	9.1	278
N**	1'085	476	1'561	95	35	130	72	25	97	471	117	588	71	273	344	1'979	1'062	3'041	3'041
données manquantes	1'139	478	1'617	200	76	276	95	30	125	404	82	486	86	459	545	2'082	1'243	3'325	3'325

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T31 Statut professionnel et revenu mensuel net à la sortie, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Statut professionnel*																			
sans activité professionnelle	29.1	41.9	32.8	48.8	71.4	54.4	34.8	10.0	27.3	17.3	14.3	16.8	20.0	21.4	21.2	28.5	35.9	30.7	290
apprenti-e, stagiaire	2.1	1.7	2.0	0.0	7.1	1.8	4.3	0.0	3.0	26.9	23.8	26.4	0.0	2.4	1.9	6.2	4.3	5.6	53
manœuvre, aide	3.3	2.9	3.2	9.3	0.0	7.0	0.0	20.0	6.1	1.9	0.0	1.6	0.0	2.4	1.9	3.3	2.8	3.2	30
ouvrier/ère formé-e sur le tas	7.0	3.5	6.0	11.6	7.1	10.5	4.3	20.0	9.1	4.8	9.5	5.6	0.0	2.4	1.9	6.5	5.0	6.0	57
ouvrier/ère formé-e (CFC)	12.2	4.7	10.0	16.3	14.3	15.8	0.0	0.0	0.0	11.5	9.5	11.2	10.0	0.0	1.9	12.4	5.7	10.4	98
contremaitre-sse	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	9
employé-e non qualifié-e	15.0	22.1	17.1	2.3	0.0	1.8	13.0	10.0	12.1	9.6	9.5	9.6	10.0	35.7	30.8	12.8	21.0	15.3	144
empl. qualifié-e, cadre moyen	13.1	12.8	13.0	4.7	0.0	3.5	26.1	30.0	27.3	4.8	0.0	4.0	20.0	9.5	11.5	11.0	10.7	10.9	103
employé-e, cadre supérieur	3.1	0.6	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	0.0	4.8	3.8	2.9	1.1	2.3	22
indépendant-e	9.6	7.6	9.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10.0	15.2	0.0	4.8	0.8	40.0	7.1	13.5	8.0	6.4	7.5	71
écolier/ère, étudiant-e	1.2	1.2	1.2	4.7	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	19.2	19.0	19.2	0.0	14.3	11.5	5.0	5.7	5.2	49
autre statut	2.1	1.2	1.8	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.9	9.5	3.2	0.0	0.0	0.0	2.1	1.4	1.9	18
N**	426	172	598	43	14	57	23	10	33	104	21	125	10	42	52	663	281	944	944
données manquantes	1'798	782	2'580	252	97	349	144	45	189	771	178	949	147	690	837	3'398	2'024	5'422	5'422

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T32a Raison principale de la fin du traitement/de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Proches			Toutes sorties			N	
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Raison principale*																				
fin régulière sans transfert	51.0	49.2	50.5	26.9	33.6	28.7	44.8	36.4	42.7	69.3	70.7	69.6	66.7	65.0	65.3	54.0	56.8	55.0	3'481	
fin régulière avec transfert	6.2	7.7	6.6	12.2	14.0	12.7	10.9	9.1	10.5	4.0	5.1	4.2	1.9	4.1	3.7	6.3	6.9	6.5	414	
changement de domicile	2.1	2.8	2.3	5.4	3.7	5.0	1.8	0.0	1.4	1.4	2.0	1.5	0.0	1.1	0.9	2.0	2.1	2.0	127	
hospitalisation	1.0	1.1	1.0	1.0	2.8	1.5	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	41	
détention	0.2	0.2	0.2	2.4	0.0	1.7	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	17	
perte de contact	28.2	27.1	27.9	33.0	29.9	32.2	29.7	38.2	31.8	16.3	16.2	16.3	19.9	21.7	21.4	25.5	23.6	24.8	1'568	
rupture explicite	8.2	9.0	8.5	12.2	11.2	12.0	9.1	14.5	10.5	7.6	5.1	7.1	7.1	6.4	6.6	8.4	7.7	8.1	514	
décès	2.0	1.9	2.0	6.1	2.8	5.2	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	1.7	1.0	1.4	90	
autre raison	1.1	1.1	1.1	0.7	1.9	1.0	0.6	1.8	0.9	1.1	1.0	1.1	3.8	1.4	1.8	1.2	1.2	1.2	77	
N**	2'210	949	3'159	294	107	401	165	55	220	871	198	1'069	156	729	885	4'037	2'292	6'329	6'329	
données manquantes	14	5	19	1	4	5	2	0	2	4	1	5	1	3	4	24	13	37	37	

T32b Destination des transferts, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

Destination des transferts***	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
traitement résidentiel	34.6	40.0	36.2	13.6	20.0	14.8	27.3	0.0	18.8	47.6	14.3	39.3	0.0	21.4	21.4	31.5	27.3	30.0	66
structure/clinique de jour	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	1.4	1.3	1.4	3
prise en charge ambulatoire	44.4	37.1	42.2	45.5	20.0	40.7	54.5	40.0	50.0	38.1	57.1	42.9	0.0	28.6	28.6	44.8	41.6	43.6	96
appartement protégé	1.2	5.7	2.6	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	6.3	4.8	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.7	6
autre institution spécialisée	18.5	17.1	18.1	40.9	60.0	44.4	9.1	60.0	25.0	9.5	28.6	14.3	0.0	42.9	42.9	19.6	27.3	22.3	49
N**	81	35	116	22	5	27	11	5	16	21	7	28	0	14	14	143	77	220	220
données manquantes	55	38	93	14	10	24	7	0	7	14	3	17	3	16	19	112	82	194	194

T32c Cause de décès, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

Cause de décès****	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%							
suicide	16.7	0.0	12.2	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	11.5	7
accident	6.7	0.0	4.9	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	4.9	3
maladie	66.7	63.6	65.9	35.7	50.0	37.5	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	58.7	53.3	57.4	35
surdose ou intoxication aiguë	3.3	18.2	7.3	35.7	50.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	26.7	16.4	10
autre cause de décès	6.7	18.2	9.8	7.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	20.0	9.8	6.0
N**	30	11	41	14	2	16	1	0	1	0	0	0	1	0	1	46	15	61	61
données manquantes	15	7	22	4	1	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	21	8	29	29

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s transféré-e-s. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

**** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s décédé-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T33 Durée de la prise en charge, selon le problème principal¹ et chez les proches (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹									Proches			Toutes sorties						
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
Durée de la prise en charge* (%)																			
1 semaine ou moins	5.8	4.5	5.4	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	2.4	2.5	2.4	10.8	12.0	11.8	4.7	6.2	5.2	332
> 1 semaine à 1 mois	3.8	2.5	3.4	2.4	4.6	3.0	4.2	1.8	3.6	8.3	7.5	8.2	8.3	4.7	5.3	5.0	3.7	4.5	286
> 1 à 2 mois	3.3	2.3	3.0	2.0	1.8	2.0	3.0	1.8	2.7	8.5	8.5	8.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.2	4.5	286
>2 à 3 mois	4.0	4.4	4.1	1.4	3.7	2.0	4.2	3.6	4.1	7.1	6.0	6.9	5.1	2.8	3.2	4.6	4.2	4.5	284
>3 à 6 mois	10.8	10.6	10.7	8.2	11.0	8.9	7.8	9.1	8.1	14.2	15.1	14.3	15.9	17.1	16.9	11.7	13.9	12.5	795
>6 mois à 1 an	26.1	29.5	27.1	23.8	28.4	25.1	31.1	45.5	34.7	35.1	35.2	35.1	30.6	34.3	33.7	29.2	32.4	30.3	1'925
>1 à 2 ans	21.7	23.2	22.1	24.8	17.4	22.8	21.0	21.8	21.2	16.3	19.1	16.9	19.1	15.7	16.3	20.3	19.6	20.0	1'271
>2 à 3 ans	9.5	9.9	9.6	10.9	9.2	10.4	11.4	3.6	9.5	4.5	4.0	4.4	3.2	5.4	5.0	7.9	7.2	7.7	486
>3 à 5 ans	9.2	8.4	9.0	13.3	9.2	12.2	10.2	9.1	9.9	3.0	2.0	2.8	1.3	2.3	2.2	7.4	5.5	6.7	425
>5 à 10 ans	5.4	4.0	5.0	8.8	12.8	9.9	6.0	3.6	5.4	0.7	0.0	0.6	1.3	0.8	0.9	4.2	2.7	3.7	232
plus de 10 ans	0.4	0.5	0.4	1.7	1.8	1.7	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	23
N**	2'218	949	3'167	294	109	403	167	55	222	875	199	1'074	157	725	882	4'054	2'291	6'345	6'345
<i>données manquantes</i>	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	21
Durée (en semaines)																			
moyenne	79.0	76.8	78.4	110.1	112.8	110.8	89.1	70.2	84.4	41.4	39.6	41.0	38.2	42.4	41.7	69.3	60.7	66.2	
écart-type	95.2	95.7	95.4	118.8	136.9	123.8	95.3	76.5	91.2	46.3	38.4	44.9	45.9	58.2	56.2	87.1	81.7	85.3	
1er quartile	21.3	25.0	22.6	32.4	27.1	30.7	31.9	28.3	30.7	11.4	12.3	11.6	9.1	12.9	12.4	18.0	17.7	17.9	
valeur médiane	46.6	48.1	47.3	66.7	52.3	63.0	51.3	42.1	47.5	30.0	31.0	30.1	27.0	28.6	28.1	40.1	35.9	38.3	
3e quartile	102.9	94.9	100.4	147.6	133.7	147.6	124.3	72.7	111.0	50.9	52.3	51.0	51.4	51.6	51.6	82.1	70.0	78.0	
N**	2'218	949	3'167	294	109	403	167	55	222	875	199	1'074	157	725	882	4'054	2'291	6'345	
<i>données manquantes</i>	6	5	11	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	14	21	

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T34 Substitution pendant et immédiatement après la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Substitution pendant la prise en charge*																
non	98.4	98.7	98.5	43.7	50.8	45.8	94.0	87.5	92.2	99.8	100.0	99.9	94.9	95.4	95.1	3'275
oui	1.6	1.3	1.5	56.3	49.2	54.2	6.0	12.5	7.8	0.2	0.0	0.1	5.1	4.6	4.9	169
N**	1'406	612	2'018	151	61	212	83	32	115	564	141	705	2'415	1'029	3'444	3'444
données manquantes	818	342	1'160	144	50	194	84	23	107	311	58	369	1'490	544	2'034	2'034
Type de substitution***																
héroïne	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.2	3.8	4
méthadone	88.2	87.5	88.0	87.0	88.9	87.5	50.0	75.0	62.5	100.0	0.0	100.0	85.3	87.1	85.8	91
autres opioïdes	11.8	12.5	12.0	10.9	11.1	10.9	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	10.7	9.7	10.4	11
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	17	8	25	46	18	64	4	4	8	1	0	1	75	31	106	106
données manquantes	6	0	6	39	12	51	1	0	1	0	0	0	47	16	63	63
Substitution après la prise en charge*																
non	99.0	99.1	99.1	70.7	75.7	72.1	100.0	92.0	97.9	99.6	100.0	99.7	97.8	98.1	97.9	2'917
oui	1.0	0.9	0.9	29.3	24.3	27.9	0.0	8.0	2.1	0.4	0.0	0.3	2.2	1.9	2.1	62
N**	1'249	556	1'805	92	37	129	72	25	97	466	117	583	2'074	905	2'979	2'979
données manquantes	975	398	1'373	203	74	277	95	30	125	409	82	491	1'831	668	2'499	2'499
Type de substitution***																
prescription d'héroïne	25.0	20.0	23.5	3.7	0.0	2.8	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	11.1	11.8	11.3	7
traitement de substitution	75.0	80.0	76.5	96.3	100.0	97.2	0.0	50.0	50.0	50.0	0.0	50.0	88.9	88.2	88.7	55
N**	12	5	17	27	9	36	0	2	2	2	0	2	45	17	62	62
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s substitué-e-s durant la prise en charge. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T35 Postcure prévue et mise en place, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Postcure prévue et mise en place*																
non	91.7	88.9	90.9	90.5	85.2	88.9	93.9	100.0	95.7	98.6	96.9	98.3	92.8	90.1	92.1	1'191
oui	8.3	11.1	9.1	9.5	14.8	11.1	6.1	0.0	4.3	1.4	3.1	1.7	7.2	9.9	7.9	102
N**	637	244	881	63	27	90	33	14	47	147	32	179	948	345	1'293	1'293
<i>données manquantes</i>	1'587	710	2'297	232	84	316	134	41	175	728	167	895	2'957	1'228	4'185	4'185
Type de la postcure prévue***																
appartement protégé de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.8	2.5	2
service de postcure de l'institution	2.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	1
appartement protégé extérieur	4.8	0.0	3.3	16.7	25.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	3.8	4.9	4
service de postcure extérieur	2.4	10.5	4.9	33.3	25.0	30.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	7.3	11.5	8.6	7
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	38.1	5.3	27.9	16.7	0.0	10.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	32.7	3.8	23.5	19
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	7.1	5.3	6.6	16.7	50.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
autre centre de consultation	11.9	42.1	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	10.9	34.6	18.5	15
groupe d'entraide	9.5	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	11.5	8.6	7
groupe d'ancien-ne-s client-e-s de l'institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autre	33.3	52.6	39.3	33.3	25.0	30.0	50.0	0.0	50.0	100.0	0.0	66.7	36.4	46.2	39.5	32
N**	42	19	61	6	4	10	2	0	2	2	1	3	55	26	81	81
<i>données manquantes</i>	11	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	21	21

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s pour lesquels une postcure est prévue. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles)

T36 Problèmes addictifs à la sortie, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Problèmes addictifs à la sortie*																
alcool	63.0	67.8	64.5	17.6	16.1	17.2	21.0	20.6	20.9	13.7	16.3	14.2	41.7	46.0	43.0	1'562
héroïne	0.9	0.5	0.8	54.9	43.5	51.5	6.7	11.8	7.9	0.5	1.3	0.6	4.2	3.4	4.0	144
méthadone	0.3	0.9	0.5	19.0	14.5	17.6	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	50
buprénorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
autres opioïdes	0.0	0.2	0.0	2.8	3.2	2.9	0.0	2.9	0.7	0.5	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	12
cocaïne en poudre	1.4	0.3	1.1	9.9	16.1	11.8	56.2	64.7	58.3	2.4	2.0	2.3	4.4	3.7	4.2	152
crack	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	4
autre forme de cocaïne	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
amphétamines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.6	1.3	1.3	1.3	0.9	0.4	0.7	26
méthamphétamines	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	4
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.9	5.9	2.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.9	0.8	29
cathinones synthétiques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
barbituriques	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
benzodiazépines	1.5	2.6	1.9	9.9	9.7	9.8	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	2.0	2.8	2.3	82
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
autres somnifères et tranquillisants	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
LSD	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3
kétamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
autres hallucinogènes	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
substances volatiles	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	4
cannabis	4.5	2.1	3.7	18.3	12.9	16.7	18.1	5.9	15.1	66.1	61.4	65.2	21.4	11.9	18.5	672
tabac	12.8	10.8	12.2	16.9	27.4	20.1	10.5	20.6	12.9	15.8	26.1	17.8	14.8	15.8	15.1	548
autre substance	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.3	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	9
jeu pathologique	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	1.4	51
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	1.1	0.3	0.9	31
troubles alimentaires	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	0.2	0.0	0.1	0.3	6.6	2.2	80
autre comportement de type addictif	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.3	0.5	1.1	39
aucun	32.0	27.9	30.7	14.1	17.7	15.2	26.7	20.6	25.2	26.4	32.0	27.5	28.1	27.6	27.9	1'014
N**	1'431	656	2'087	142	62	204	105	34	139	622	153	775	2'537	1'094	3'631	3'631
données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

T37 Fréquence des rechutes et substance ou comportement impliqué pendant la prise en charge, selon le problème principal¹ (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence des rechutes*																
aucune	56.2	43.3	52.5	38.6	33.3	37.1	61.9	20.0	48.4	67.0	55.2	64.3	57.5	44.2	53.7	475
une fois	12.2	11.7	12.0	6.8	11.1	8.1	4.8	0.0	3.2	4.1	13.8	6.3	10.1	12.4	10.7	95
deux fois	5.9	11.7	7.5	6.8	5.6	6.5	9.5	30.0	16.1	7.2	6.9	7.1	6.5	10.8	7.7	68
trois ou quatre fois	11.0	13.5	11.7	20.5	5.6	16.1	4.8	30.0	12.9	9.3	6.9	8.7	10.7	12.0	11.1	98
cinq fois ou plus	14.8	19.9	16.2	27.3	44.4	32.3	19.0	20.0	19.4	12.4	17.2	13.5	15.3	20.5	16.7	148
N**	427	171	598	44	18	62	21	10	31	97	29	126	635	249	884	884
<i>données manquantes</i>	1'797	783	2'580	251	93	344	146	45	191	778	170	948	3'270	1'324	4'594	4'594
Substance/comportement addictif lors des rechutes***																
alcool	98.9	98.9	98.9	33.3	18.2	28.9	71.4	25.0	46.7	41.9	30.8	38.6	81.1	74.4	78.9	306
opioïdes	1.1	0.0	0.7	88.9	81.8	86.8	14.3	25.0	20.0	3.2	7.7	4.5	12.0	10.1	11.3	44
cocaïne et dérivés	2.2	0.0	1.5	29.6	27.3	28.9	100.0	87.5	93.3	3.2	7.7	4.5	7.7	8.5	8.0	31
autres stimulants	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	9.1	1.5	0.0	1.0	4
somnifères/tranquillisants	2.2	6.7	3.7	3.7	0.0	2.6	14.3	12.5	13.3	0.0	0.0	0.0	3.1	7.0	4.4	17
hallucinogènes	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	5.5	0.0	3.7	33.3	36.4	34.2	42.9	0.0	20.0	96.8	76.9	90.9	20.8	12.4	18.0	70
tabac	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	15.4	6.8	1.2	2.3	1.5	6
autres substances	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
jeu pathologique	0.6	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	4
dépendances aux ordinateurs/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.3	2.3	0.0	1.5	6
troubles alimentaires	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.3	0.0	3.9	1.3	5
autre comportement de type addictif	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	181	89	270	27	11	38	7	8	15	31	13	44	259	129	388	388
<i>données manquantes</i>	6	8	14	0	1	1	1	0	1	1	0	1	11	10	21	21

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une ou plusieurs rechutes. Les catégories ne sont pas exclusives (plusieurs réponses possibles); pourcentages par colonne

T38 Fréquence de la consommation de tabac et nombre de cigarettes par jour au cours des 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal¹ (selement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: problème principal ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioides			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Fréquence de la consommation de tabac*																
jamais	37.8	41.3	38.8	7.1	10.0	8.1	27.8	18.2	24.1	15.5	24.0	17.2	32.1	36.6	33.4	291
1 jour par semaine ou moins	0.9	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	1.0	0.4	0.8	7
2 à 3 jours par semaine	0.2	1.8	0.7	0.0	5.0	1.6	11.1	9.1	10.3	4.9	0.0	3.9	1.6	2.1	1.7	15
4 à 6 jours par semaine	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.0	2.3	0.8	0.8	0.8	7
une fois par jour	1.6	2.4	1.8	2.4	5.0	3.2	0.0	0.0	0.0	4.9	4.0	4.7	2.1	2.9	2.3	20
plusieurs fois par jour	58.7	53.3	57.2	90.5	80.0	87.1	61.1	72.7	65.5	70.9	68.0	70.3	62.5	57.2	61.0	532
N**	429	167	596	42	20	62	18	11	29	103	25	128	629	243	872	872
<i>données manquantes</i>	<i>1'795</i>	<i>787</i>	<i>2'582</i>	<i>253</i>	<i>91</i>	<i>344</i>	<i>149</i>	<i>44</i>	<i>193</i>	<i>772</i>	<i>174</i>	<i>946</i>	<i>3'276</i>	<i>1'330</i>	<i>4'606</i>	<i>4'606</i>
Nombre de cigarettes par jour***																
0 à 10 cigarettes par jour	17.2	25.3	19.4	5.9	23.5	11.8	20.0	42.9	29.4	38.9	41.2	39.3	21.4	27.8	23.2	113
11 à 20 cigarettes par jour	42.5	53.0	45.4	52.9	47.1	51.0	50.0	28.6	41.2	41.7	35.3	40.4	43.9	49.6	45.5	222
21 à 30 cigarettes par jour	28.5	20.5	26.3	38.2	23.5	33.3	30.0	28.6	29.4	16.7	17.6	16.9	26.5	20.3	24.8	121
31 cigarettes par jour ou plus	11.8	1.2	8.9	2.9	5.9	3.9	0.0	0.0	0.0	2.8	5.9	3.4	8.2	2.3	6.6	32
N**	221	83	304	34	17	51	10	7	17	72	17	89	355	133	488	488
<i>données manquantes</i>	<i>46</i>	<i>15</i>	<i>61</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>17</i>	<i>72</i>	<i>21</i>	<i>93</i>	<i>93</i>

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

*** Les résultats ne se basent que sur les client-e-s ayant indiqué une consommation de tabac. Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

T39 Objectif de consommation à la sortie et pronostic, selon la principale substance posant problème¹ (seulement patient-e-s) (2013)

	Patient-e-s: principale substance posant problème ¹												Tous patient-e-s			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Objectif de consommation*																
abstinence définitive	34.3	36.7	35.0	70.2	73.9	71.4	86.4	60.0	78.1	54.1	46.7	52.5	42.0	41.2	41.7	427
abstinence limitée dans le temps	14.9	15.9	15.2	4.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	9.2	6.7	8.6	12.1	12.2	12.1	124
consommation contrôlée	32.9	31.4	32.5	8.5	17.4	11.4	9.1	40.0	18.8	19.3	20.0	19.4	29.2	29.9	29.4	301
aucune limitation envisagée	4.4	2.4	3.8	6.4	4.3	5.7	0.0	0.0	0.0	9.2	20.0	11.5	5.1	4.4	4.9	50
pas déterminé pour l'instant	11.5	12.6	11.8	8.5	4.3	7.1	4.5	0.0	3.1	8.3	6.7	7.9	9.9	10.5	10.1	103
autre	2.0	1.0	1.7	2.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	18
N**	504	207	711	47	23	70	22	10	32	109	30	139	729	294	1'023	1'023
données manquantes	1'720	747	2'467	248	88	336	145	45	190	766	169	935	3'176	1'279	4'455	4'455
Pronostic*																
très bon pronostic	15.5	14.7	15.3	0.0	13.6	4.7	20.0	21.4	20.5	22.6	23.1	22.7	16.0	15.8	16.0	168
bon pronostic	45.7	43.5	45.1	45.2	40.9	43.8	40.0	7.1	28.2	44.3	46.2	44.7	45.9	43.2	45.2	475
plutôt mauvais pronostic	26.3	30.4	27.4	33.3	31.8	32.8	36.0	50.0	41.0	27.8	26.9	27.7	27.0	30.2	27.9	293
mauvais pronostic	12.5	11.5	12.2	21.4	13.6	18.8	4.0	21.4	10.3	5.2	3.8	5.0	11.1	10.8	11.0	116
N**	536	191	727	42	22	64	25	14	39	115	26	141	774	278	1'052	1'052
données manquantes	1'688	763	2'451	253	89	342	142	41	183	760	173	933	3'131	1'295	4'426	4'426

¹ Le problème principal est établi à l'entrée. Cette information n'est pas disponible pour les client-e-s entré-e-s avant le début du monitoring.

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

ANNEXE

A1 Données de base d'institutions non participantes: sexe et âge à l'admission, selon le problème principal (2013)

	Patient-e-s: problème principal												Toutes prises en charge***			
	Alcool			Opioïdes			Cocaïne et dérivés			Cannabis			Hommes	Femmes	Total	N
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sexe*																
hommes			62.0			63.6			81.3			69.0			64.7	720
femmes			38.0			36.4			18.8			31.0			35.3	393
sexe pas connu			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	353	216	569	56	32	88	39	9	48	127	57	184	720	393	1'113	
Age (en années)*																
jusqu'à 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.8	4.4	1.4	0.5	1.1	12
15-19	0.9	2.9	1.6	0.0	3.1	1.1	2.6	11.1	4.2	50.4	18.2	40.7	11.3	5.5	9.3	102
20-24	4.3	2.9	3.8	12.5	21.9	15.9	15.4	0.0	12.5	12.6	12.7	12.6	8.8	7.0	8.2	90
25-29	11.8	9.1	10.8	16.1	28.1	20.5	15.4	33.3	18.8	8.7	7.3	8.2	12.0	11.7	11.9	131
30-34	11.8	4.3	9.0	17.9	12.5	15.9	28.2	33.3	29.2	4.7	5.5	4.9	12.0	8.6	10.8	119
35-39	6.3	11.5	8.3	19.6	21.9	20.5	23.1	11.1	20.8	4.7	10.9	6.6	8.5	12.5	9.9	109
40-44	10.1	10.0	10.1	16.1	12.5	14.8	10.3	0.0	8.3	3.9	21.8	9.3	10.4	12.8	11.2	123
45-49	14.7	14.8	14.7	10.7	0.0	6.8	2.6	11.1	4.2	3.1	10.9	5.5	10.6	12.2	11.2	123
50-54	17.3	17.2	17.3	5.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.1	9.1	4.9	10.5	12.0	11.0	121
55-59	9.8	8.6	9.4	1.8	0.0	1.1	2.6	0.0	2.1	3.1	0.0	2.2	6.7	5.7	6.4	70
60-64	4.9	8.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	3.1	5.7	4.0	44
65-69	2.6	5.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	2.3	25
70-74	4.3	3.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	2.1	23
75 et plus	1.2	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	6
N**	347	209	556	56	32	88	39	9	48	127	55	182	714	384	1'098	
données manquantes	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	
Age (valeurs centrales)																
moyenne	45.2	47.1	45.9	35.6	31.0	33.9	32.9	30.8	32.5	24.5	34.4	27.5	38.4	41.8	39.5	
écart-type	13.7	13.6	13.7	8.9	7.2	8.6	8.1	7.3	7.9	11.6	13.1	12.8	14.9	14.1	14.7	
1er quartile	33.1	38.7	34.8	29.4	25.4	26.6	26.4	26.5	26.4	16.9	21.1	17.2	26.4	30.1	27.8	
valeur médiane	46.6	48.1	47.4	35.3	29.2	33.2	32.4	30.5	31.6	19.3	37.5	22.0	36.9	42.3	39.3	
3e quartile	54.3	56.5	54.7	42.3	37.5	40.4	37.39	34.3	37.0	28.1	44.9	38.3	49.9	51.3	50.4	
N**	347	209	556	56	32	88	39	9	48	127	55	182	714	384	1'098	
données manquantes	6	7	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	15	

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu

A2 Données de base d'institutions non participantes: problème principal à l'admission (2013)

Tous patients et patientes				
	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	%	N
Problème principal*				
alcool	52.5	58.9	54.7	569
opioïdes	8.3	8.7	8.5	88
cocaïne	5.8	2.5	4.6	48
autres stimulants	1.2	1.4	1.3	13
hypnotiques/sedatives	1.9	1.9	1.9	20
hallucinogènes	0.4	0.3	0.4	4
substances volatiles	0.0	0.0	0.0	0
cannabis	18.9	15.5	17.7	184
tabac	0.3	0.0	0.2	2
autre substance	1.9	0.5	1.4	15
consommation multiple**	8.3	9.3	8.7	90
non lié à une substance	0.4	1.1	0.7	7
N***	673	367	1'040	1'040
<i>données manquantes</i>	47	26	73	73

* Pourcentages par colonne; une seule catégorie possible

** Plusieurs institutions ne définissent pas le problème principal selon les directives d'act-info et répertorient notamment la "consommation multiple". Ainsi, la distribution résultante n'est pas directement comparable avec celle des institutions participantes

*** Nombre exact de cas sur lesquels sont calculées les valeurs de la colonne correspondante (données manquantes exclues). Le cas échéant, les totaux comprennent également les personnes dont le sexe n'est pas connu